丹溪先生心法

附錄

四

叢書集成

初編

主編者

王雲五

商務印書館發行



丹溪先生心法

附錄

（四）

朱震亨撰
程充編訂

丹溪先生心法卷五

癰疽八十五

○癰疽只是熱勝血．六陽經．六陰經．有多氣少血者．有少氣多血者．有多氣多血者．不可一概論也．若夫要害處近虛怯薄處．前哲已曾論及．惟分經之言未聞．諸經惟少陽厥陰經生癰疽．理宜預防．以其多氣少血．肌肉難長．瘡久未合．必成死症．遽用驅毒利藥．以伐其陰分之血．禍不旋踵．陽滯於陰．脈浮洪弦數．陰滯於陽．脈沉細弱濇．陽滯以寒治之．陰滯以熱治之．人中年以後．不可生癰．纔有痛腫．參之脈證．但見虛弱．便與滋補氣血．可保終吉．若用尋常驅熱拔毒紓氣之藥．虛虛之禍．如指諸掌．內托之法．河間治腫瘍于外．根盤不深．形證在表．其脈多浮．病在皮肉．非氣盛則必侵於內．急須內托以救其裏．宜復煎散．除溫散鬱．使胃氣和平．如或未已．再煎半料飲之．如大便秘及煩熱．少服黃連湯．如微利及煩熱已退却．與復煎散半兩．如此．使榮衛俱行．邪氣不能內傷也．然世俗多用排膿內補十宣散．若用之於此．小瘡與冬月時令．卽可．若潰瘍於夏月用之．其桂朴之溫散．佐以防風、白芷．吾恐雖有參、芪．難爲倚杖．

一婦年七十．形實性急．而好酒．腦生疽．纔五日．脈緊急且濇．急用大黃酒煨細切．酒拌炒爲末．又酒拌人參炒．入姜煎．調一錢重．又兩時再與．得睡而上半身汗．睡覺病已失．此內托之意．

又一男子．年五十．形實色黑．背生紅腫．及胛骨下痛．其脈浮數而洪緊．食亦嘔．正冬月．與麻黃桂枝湯加酒黃柏、生附、瓜蔞子、

甘草節、羌活、青皮、人參、黃芩、半夏、生薑。六貼而消。此正內托之法。非精要內托散乳香蔻豆等藥。想此方專爲服丹石而發疽者設。不因丹石而發。恐非必用之劑。　瘡先發爲腫。氣血鬱積蒸肉爲膿。故其痛多少。瘡之始作時也。膿潰之後。腫退肌寬。痛必漸減而反痛者。此爲虛。宜補。亦有穢氣所觸。宜和解。風寒逼者。宜溫散。

○腸癰。　大腸有痰積。死血流注。桃仁承氣湯加連翹、秦艽。近肛門破入風者難治。防風之類。

○乳癰。　乳房、陽明所經。乳頭、厥陰所屬。乳子之母。不知調養。怒忿所逆。鬱悶所遏。厚味所釀。以致厥陰之氣不行。故竅不得通而汁不得出。陽明之血沸騰。故熱甚而化膿。亦有所乳之子。膈有滯痰。口氣煩熱。合乳而睡。熱氣所吹。遂生結核。於初起時。便須忍痛。揉令稍軟。吮令汁透。自可消散。失此不治。必成癰癤治法。疎厥陰之滯。以青皮、清陽明之熱。細研石膏。行汙濁之血。以生甘草之節。消腫導毒。以瓜蔞子或加沒藥、青橘葉、皂角刺、金銀花、當歸。或湯或散。或加減。隨意消息。然須以少酒佐之。若加以艾。火兩三壯於腫處。其效尤捷。不可輒用針刀。必至危困。若不得於夫。不得於舅姑。憂怒鬱悶。肝氣橫逆。遂成隱核。如大棋子。不痛不痒。數十年後。方爲瘡陷。名曰妳岩。以其瘡形嵌凹似岩穴也。不可治矣。若於始生之際。便能消釋病根。使心清神安。然後施之治法。亦有可安之理。

乳癰方

青皮　瓜蔞　橘葉　連翹

桃仁　皂角刺

右以水煎。入酒服。

乳癰妳勞腫

石膏煅　樺皮燒

青皮　甘草節破多加參芪。

右以水煎服。

治乳有核

南星　貝母　瓜蔞子　甘草節

連翹半兩。　甘草節　瓜蔞各一兩。

右以水煎。入酒服。

又方

人參　黃芪　川芎　當歸

青皮　連翹　瓜蔞　白芍

甘草節　乳岩小破。加柴胡、川芎。

右以水煎。入酒服。

乳硬痛

沒藥一錢.　甘草三錢.　當歸三錢.

右作一服.水煎.入酒少許.熱飲.

吹妳

金銀花　大蕎麥　紫葛藤等分.

右以醋煎.洗患處立消.如無下二物.只金銀花亦可.

乳栗破　少有破.必大補.

人參　黃芪　白朮　當歸

川芎　連翹　白芍　甘草節

右以水煎服.

附骨癰

熱在血分之極細初覺.先以青皮、甘草節.後破當養血.初腿腫.以人參、黃連、茯苓各二錢.瓜蔞子四十八粒.作二貼.入竹瀝.熱飲之.

治環跳穴痛不已.防生附骨疽.

以蒼朮佐黃柏之辛.行以青皮.冬月加桂枝.夏月加條子芩.體虛者加牛膝.以生甘草爲使.大料煎.入

姜汁帶辣食前飲之。病深者恐疒、柏、桂枝十數貼發不動。加少麻黃二三貼又不動。恐癰將成矣。急掘地坑。以火煆紅。沃以小便。赤體坐其上。以被席圍抱下截。使熱氣重蒸。腠理開。氣血暢而愈。

鉄圍散　治癰疽腫毒。

乳香　沒藥半兩。　大黃　黃柏
黃連　南星　半夏　防風
皂角刺　木鱉子　瓜蔞　甘草節
草烏　阿膠

右爲末。醋調成膏。砂石器內火熬黑色。鵝翎傅之。

圍藥　諸般癰疽。傅上消散。

乳香　沒藥　大黃　連翹
黃芩　黃連　黃柏　南星
半夏　防風　羌活　瓜蔞
阿膠　皂角刺

右研爲細末。好醋煎黑色成膏。寒者熱用。熱者寒用。

圍藥鉄井欄

貝母　南星各七錢.　連翹　五倍子

經霜芙蓉葉各一兩.

右碾爲細末.用水調傅四向腫處.止留中間一竅出毒氣.

隔皮取膿法

驢蹄細切.一兩.　蕎麥麵一兩.　白鹽半兩.　草烏四錢.去皮.

右爲末.水調作餅子.慢火炙微黃色.出火毒.研末.醋調成膏.用白紙攤貼患處.水自毛孔而出.其腫自退.

騎馬癰

用大粉草帶節四兩.長流水一碗.以甘草淬焙水盡爲末.入皂角炭少許.作四服.湯調頓服效.

又方

甘草節、白芷、黃連.破者龍骨、枯礬、赤石脂併用.

敷疽癤方

草烏　黃連　紫荊皮　白芷

大黃　芙蓉皮　朴硝　稷米各等分.

右爲末.蜜水調敷.如瘡盛.以蜜調雄黃末.圍定瘡穴.大小前後敷前藥末.

一人肛門生瘡久不收口有針竅三孔勞力則有膿

黃芪　條芩　連翹　秦艽

右爲末神麴糊爲丸

取朽骨久疽及痔漏者有之

取烏骨雞脛骨以上等雌黃實之鹽泥固濟火煅通紅取出地上出火毒去泥用骨研細飯丸如粟大以紙撚送入孔中竅內更用膏藥貼之

便毒

山梔子　大黃　乳香　沒藥

當歸五分　瓜蔞仁三錢　代赭石一錢

右作一服煎

又方

木鱉子　大黃　瓜蔞　桃仁

草龍膽

右㕮咀濃煎露星月一宿清早溫服立愈

又方　白殭蠶槐花爲末酒調服一方加酒大黃

【附方】

消毒飲　治便毒初發三四日可消。

皂角刺　金銀花　防風　當歸
大黃　甘草節　瓜蔞仁等分。

右㕮咀。水酒各半煎。食前溫服。仍頻提掣頂中髮。立效。

機要內托復煎散　癰疽托裏健胃。

地骨皮　黃芩　茯苓　白芍
人參　黃芪　白朮　桂
甘草　防己　當歸各一兩。　防風三兩。

右㕮咀。先以蒼朮一斤。水五升。煎至三升。去朮。入前十二味。再煎至三四盞。取清汁。分三四次。終日飲之。又煎蒼朮粗爲湯。去粗。依前又煎前十二味粗。分飲之。

內疎黃連湯　治瘡皮色腫硬。發熱而嘔。大便閉。脈洪實者。

黃連　芍藥　當歸　檳榔
木香　黃芩　梔子　薄荷
桔梗　甘草各一兩。　連翹二兩。　大黃二兩半

右咬咀。每服一兩。入姜煎。

疔癰八十六

○疔癰。用針刀鏃破頭上。以蟾酥敷之。後用蚕豆、野菊莎末。酒調飲。醉睡。覺即定痛熱除。不必去疔自愈也。治一切疔瘡。用紫梗菊花根莖葉皆可。研碎取汁。滴口中飲之。○瘰癧。血氣痰熱。以牡礪煅過爲末。玄參搗膏爲丸。○桑椹黑熟者。搗汁熬膏。湯調服。紅者晒乾爲末。湯調服。○師云。大田螺連肉燒灰存性爲末。入麝香少許。濕則乾敷。乾則油調敷。夏枯草。大能散結氣。而有補養血脈之功。能退寒熱。虛者儘可倚仗。若實者。以行散之藥佐之。外施艾灸。亦漸取效。

【入方】治瘰癧。

海藻洗去砂土。晒乾。　昆布採去土。同上二味。先研爲末。　何首烏木臼搗爲末。

皂角刺炒令黃色。　公蛇退樹上或牆上是雄。用一條。平地上者是雌。

右五味爲細末。和勻一處。猪項下刀口肉燒熟。醮前藥末喫。食後倒患處眠一伏時。每核灸七壯。口中覺烟起爲度。膿盡卽安。初生起時灸曲池。男左女右。

【附方】

寶鑑保生挺子　治疔瘡、背疽、瘰癧。一切惡瘡。

金脚信　雄黃　礬砂各二錢。　麝一錢。

輕粉半大匣。半大盞。巴豆四十九粒。文武火炒研。

右爲極細末。用黃蠟五錢溶開。將藥和成挺子。冷水浸少時取出。旋丸捏作餅子。如銀眼大。將瘡頭撥開。安一餅子。次用神聖膏貼。後服托裏散。若瘡氣入腹。危者服破棺丹。

神聖膏　治一切惡瘡。

當歸　藁本各半兩。　沒藥二錢。　黃丹

黃蠟各二兩。　乳香二錢。　琥珀二錢半。　膽礬

粉霜各一錢。　白膠香二兩。　清油二斤。　木鱉子五十箇。去皮。

巴豆十五箇。去殼。　槐枝　柳枝各一百二十條。

右作一處。先將槐枝、柳枝下油內熬焦。取出不用。後下餘藥。熬至焦黑。亦漉出不用。將油澄清。下黃丹再熬成膏。用綿帛攤之。立效。

千金托裏散　治疔瘡發背。一切惡腫。

官桂　人參　甘草　川芎

白芷　芍藥各一兩。　木香　沒藥各三錢。

乳香二錢。　當歸半兩。　連翹一兩二錢。　黃芪一兩半。

防風　桔梗　厚朴各二兩。

右十五味爲細末、每服三錢、酒一大盞、煎三二沸、和柤溫服、無時、

破棺丹　治瘡腫一切風熱

大黃二兩半生半熟　芒硝　甘草各一兩

右爲末、煉蜜丸如彈子大、每服半丸、食後茶清溫酒任化下、童便半盞研化服、亦得、忌冷水、

太乙膏　治癰子瘡神效

腦子一錢研　輕粉　乳香各二錢研　麝香三錢研

沒藥四錢研　黃丹五兩

右用清油一斤、先下黃丹熬、用柳枝攪、又用慈兒葱七枝、先下一枝熬焦、再下一枝、葱盡爲度、下火不住手攪、覷冷熱得所、入腦子等藥攪勻、磁器盛之、用時旋攤、

尅効散　治癰子瘡

官桂　硇砂各半錢　赤小豆　粳米各四十九粒

班猫四十九箇、不去翅足、

右五味、研爲末、初服一字、次服二字、次服三字、次服四字、煎商陸根湯送下、空心服、小便淋瀝爲效、如惡心嘔吐黃水、無妨、瘭癰日日自消矣、

玉燭散　治瘭癰和血通經、服之自消、日進一服、七八日取效、方見婦人類、

東垣升陽調經湯

治瘰癧遶頸。或至頰車。此皆出足陽明胃經中來。若瘡深遠隱曲肉底。是足少陰腎經中來。乃戊脾傳於癸腎。是夫傳與妻。俱作塊子。堅硬大小不等。並皆治之。或作丸亦可。

升麻八錢，　葛根　草龍膽酒製。　酒芩

羌活酒洗炒。　三稜酒炒。　甘草炙。　黃連酒洗。

連翹　桔梗已上各五錢。　生黃芩四錢。　歸梢

芍藥各三錢。　黃柏酒炒。二錢。　知母酒洗炒。一兩。

右另秤一半作末。煉蜜爲丸。菉豆大。每服百餘丸。一半作咬咀。每服五錢。若能食。大便硬。可旋加至七八錢。水二盞。先浸半日。煎至一盞。去柤。臨臥熱服。足高去枕仰臥。嚥一口。作十次嚥下。留一口在後送下丸藥。服畢。其臥如常。

金湯疳癬諸瘡八十七

金瘡　五倍子、紫蘇等分。

又方　白膠香三錢。龍骨一錢。

金瘡狗咬

五月五日午時。用陳石灰一斤。搗爲末。韭一斤。搗汁。和成餅。陰乾爲細末。敷之。

治陽證腫毒幷金瘡

大粉草剉細。用竹筒一段。割去青。兩頭留節。節上開一竅。入粉草在內。滿後。用油灰塞孔竅。從立冬日放糞缸內。待立春先一日取起。竪立在有風無日陰處二十一日。多最好。却破竹取草爲細末。用傅金瘡。乾者水調。

火燒

桐油二錢。　水二錢。

右二件。以桃柳枝不住手攪成膏。再入少水溶。外用猫兒肚底毛細剪摻上。

湯澆　以淋了茅三次灰柤付患處。

湯火瘡　臘月猪膽。塗黃柏炙乾爲末。付之。

膿瘡

乳香　沒藥　水銀　當歸各半兩

川芎　貝母　黃丹二錢半。　眞麻油五兩。

右咬咀。除黃丹水銀外。先將餘藥用香油熬黑色。去柤。下黃丹水銀。又煎黑色。用柳桃枝攪成膏。油紙攤貼。

又方

龍骨生用　血竭　赤石脂共一兩　頭髮如指大

黃蠟一兩　白膠香　香油不拘多少

右件先以香油煎頭髮三五沸去髮入黃蠟白膠香却入龍骨血竭赤石脂攪勻安在水盤內候冷取起以磁器盛之每遇一瘡捻作薄片貼瘡口以竹箬貼在外三日後番過再貼仍服活血藥

又方

用砂糖水煎冬青葉三五沸撈起石壓平將葉貼瘡上日換二次

又方

以頭垢燒灰和臘肉搗作膏先以葱椒葉煎湯洗淨用輕粉摻上却以前膏雨傘紙攤貼之

又方

地骨皮一兩　白蠟半兩　甘草節半兩

右以香油入地骨皮甘草節文武火熬熟去粗入黃丹一兩半緊火熬黑提起白紙攤貼之次用冬青葉醋煎過以藥貼之

杖瘡疼

黃柏生地黃紫荊皮皆要藥熬血作痛　涼血去瘀血爲先須下鷄鳴散之類　生地黃黃柏爲末童便調付或加韭汁　不破者以韭菜葱頭舂碎炒熱貼冷則易　膏藥紫荊皮乳香沒藥生地黃

黃柏、大黃之類。

又方

用大黃黃柏爲末。生地黃汁調付。乾卽再付。

又方

野生苧麻根。嫩者不拘多少。洗淨。同鹽擂。付瘡上。神效。傷重多用鹽。

癬瘡

防風通聖散去硝黃、加浮萍、皂角刺。 又紫蘇、樟樹、蒼耳、浮萍、煎湯洗。

又方

浮萍一兩。 蒼耳 蒼朮二兩。 苦參一兩半。
黃芩半兩。 香附二錢半。
右爲末。酒糊丸。

又方

蘆會 大黃 輕粉 雄黃
蛇床子 槐樹皮 檳榔
右爲末。先刮癬。用米醋調藥末塗之。

又方

蘆會研三錢　江子去殼十四粒　蓽麻子去殼十四粒　班猫七箇去翅足　白蠟

右以香油二兩熬江子、蓽麻、班猫三藥以黑爲度去藥入蠟幷蘆會末在內用磁罐盛貯微微刮癬令破以油塗上過夜略腫即愈

下疳瘡

蛤粉　蠟茶　苦參　密陀僧

右爲末河水洗淨臘猪油調傳兼治臊瘡

又方

米泔水洗瘡淨用頭髮以鹽水洗淨去油再用清湯洗晒乾燒灰敷瘡上即時生靨

【附方】

冰霜散　治火燒燎損傷油熱澆傷皮爛肉大痛

寒水石生　牡礪煆　明朴硝　青黛各一兩

輕粉一錢

右爲末新水調或油調濕則乾貼痛處立止如神

聖粉散　治下注疳瘡。蝕臭腐爛。疼痛不可忍者。

黃柏蜜炙　蜜陀僧　黃丹　高末茶

乳香各三錢。　輕粉一錢半。　麝少許。

右爲末。用葱湯洗瘡後。次貼此藥。兼治小兒疳瘡。

下疳瘡洗藥

黃連　黃柏　當歸　白芷

獨活　防風　朴硝　荆芥

右等分。水煎。入錢五十文。烏梅五箇。鹽一匙。同煎。溫洗。日五七次。用下藥敷。

木香　檳榔　黃連　銅靑

輕粉　枯礬　螵蛸　麝各等分兩。

右爲極細末。洗後。至夜敷上。

婦人八十八

婦人經水過期。血少也。四物加參、朮、帶痰加南星、半夏、陳皮之類。經水不及期而來者。血熱也。四物加黃連。過期紫黑有塊。亦血熱也。必作痛。四物加香附、黃連。過期淡色來者。痰多也。二陳加川芎、當歸。過期而來。乃是血虛。宜補血。用四物加黃芪、陳皮、升麻。未及期先來。乃是氣血俱熱。宜涼氣血。柴

胡、黃芩、當歸、白芍、生苄、香附之屬。經不調而血水淡血。宜補氣血。參、芪、芎、歸、香附、白芍。腹痛加膠珠、艾葉、玄胡索。經候過而作痛者。乃虛中有熱。所以作痛。經水將來作痛者。血實也。一云氣滯四物加桃仁、黃連、香附。臨行時腰疼腹痛。乃是鬱滯。有瘀血。宜四物加紅花、桃仁、莪朮、玄胡索、香附、木香。發熱加黃芩、柴胡。紫色成塊者。熱也。四物加黃連、柴胡之類。痰多占住血海地位。因而下多者。目必漸昏。肥人如此。用南星、蒼朮、川芎、香附作丸子服之。肥人不及日數而多者。痰多、血虛有熱。亦用前丸。藥中更加黃連、白朮、丸服。血枯經閉者。四物加桃仁、紅花。軀脂滿經閉者。以導痰湯加黃連、川芎。不可服地黃。泥膈故也。如用以姜汁炒。肥胖、飲食過度之人。而經水不調者。乃是濕痰。宜蒼朮、半夏、滑石、茯苓、白朮、香附、川芎、當歸。臨經來時肚痛者。四物湯加陳皮、玄胡索、牡丹、甘草。痛甚者。豆淋酒。痛緩者。童便煮莎。入炒條芩末爲丸。經水去多不能住者。以三補丸加莎根、龜板、金毛狗脊。陰虛經脈久不通。小便澁。身體疼痛。以四物加蒼朮、牛膝、陳皮、生甘草。又用蒼莎丸加蒼耳、酒芩藥爲丸。就煎前藥吞下。

【入方】治經水過多。

黃芩炒。　白芍炒。　龜板炙。各一兩。　黃柏炒。三錢。

椿樹根皮七錢半。　香附子二錢半。

右爲末。酒糊丸。空心溫酒或白湯下五十丸。

又方　治積痰傷經不行。夜則妄語。

瓜蔞子一兩。　黃連半兩。　吳茱萸十粒。　桃仁五十箇。
紅麴二錢。　砂仁三兩。
右爲末。生姜汁化。炊餅爲丸。桐子大。服百丸。空心。
又方　治一切瘀血爲痛。
香附四兩醋煮。　瓦壟子煅二兩。醋煮一晝夜。　桃仁二兩。
牡丹皮　大黃熟蒸。　當歸各一兩。　川芎
紅花各半兩。
右爲末。蒸餅丸如桐子大。空心溫酒下三五十丸。
【附方】
四物湯　治衝任虛損。月水不調。臍腹疼痛。
當歸　川芎　芍藥　熟干等分。
右以水煎服。加減于后。
若經候微少。漸漸不通。手足煩疼。漸瘦。生潮熱。脈微數。本方去地黃、芎、加澤蘭葉三倍。甘草半分。經候過多。本方去熟地黃。加生干。或只加黃芩、白朮。經行身熱。脈數。頭昏。本方加柴胡、芩。經行微少。或脹或疼。四肢疼痛。加延胡、沒藥、白芷、與本方等。淡醋湯調下末子。經候不調。心腹疼痛。只用芎歸

二味。名君臣散。氣冲經脈。故月事頻併。臍下多痛。加芍藥。經欲行。臍腹絞痛。加胡胡、檳榔、苦練。炒木香減半。經水澁少。加爽花、紅花。經水適來適斷。或有往來寒熱。先宜服小柴胡湯。後以四物和之。經候過而作痛。血氣俱虛也。宜本方對四君子湯服之。

治經事過期不行

玄胡索一錢。　香附　枳殼各半錢。

右爲末。杜牛膝搗汁半鍾。空心調服。

交加地黃丸　治經水不調。血塊氣痞。肚腹疼痛。

生芐一斤。　老生姜一斤。　玄胡索　當歸

川芎　白芍二兩。　沒藥　木香各一兩。

桃仁去皮尖。　人參各一兩半。　香附子半斤。

右先將地黃、生姜各搗汁。以姜汁浸地黃焙。地黃汁浸生姜焙。皆以汁盡爲度。次將餘藥爲末。共作一處。日乾。同爲末。醋糊丸如桐子大。空心服五十丸。姜湯下。

當歸散　治經脈不通。

當歸　川山甲灰炒。　蒲黃各半兩。炒。　辰砂一錢。

麝香少許。

右爲末。酒調服二錢。

琥珀散　治月水不通。心膈迷悶。腹藏撮痛。

台烏二兩。　當歸　莪朮各一兩。

右爲末。空心溫酒調二錢。以食壓之。產後諸疾。炒姜酒調下。

通經丸　治婦人室女經候不通。臍腹疼痛。或成血瘕。

川椒炒。　莪朮　乾漆炒烟盡。　當歸

青皮　乾姜　大黃煨。　桃仁去皮尖。炒。

川烏炮。　桂心各等分。

右爲末。將一半用米醋熬成膏子。和餘藥成劑。臼中杵之。丸如桐子。陰乾。每服三五十丸。醋湯下。　嚴氏方。無川烏。有紅花。

紅花當歸散　治婦人血藏虛竭。或積瘀血。經候不行。時作痛。腰膀重疼。小腹堅硬。及室女經水不行。

紅花　當歸尾　紫葳卽凌霄花。　牛膝

甘草炙。　蘇木各三兩。　白芷　桂心一兩半。

赤芍九兩。　劉寄奴五兩。

右爲末。空心熱酒調三錢服。一名凌霄花散。

導痰湯　見痰類。
三補丸　見諸虛類。
蒼莎丸　見咳嗽類。
越鞠丸　見六鬱類。

崩漏八十九

○血崩東垣有治法。但不言熱。其主在寒。學者宜尋思之。急則治其標。用白芷湯調百草霜末。甚者用棕櫚灰。後用四物湯加炒乾姜調理。因勞者。用參、芪、帶升補藥。因寒者。用乾姜。因熱者。黃芩。崩過多者。先用五靈脂末一服。當分寒熱。蓋五靈脂能行能止。紫色成塊者熱。以四物湯加黃連之類。婦人血崩。用香附白芷丸服。氣虛血虛者。皆以四物湯加參、芪。漏下乃熱而虛。四物加黃連。崩中白帶。用椒目末。又用白芷石灰炒去灰爲末。茜草少許。粥丸服。一方。用生狗頭骨燒灰存性。或酒調服。或入藥服。一方。五靈脂半生半炒爲末。酒調服。經血逆行。或血腥。或吐血。或唾血。用韭菜汁服。效。夫婦人崩中者。由臟腑傷損。衝任二脈。血氣俱虛故也。二脈爲經脈之海。血氣之行。外循經絡。內榮臟腑。若氣血調適。經下依時。若勞動過極。臟腑俱傷。衝任之氣虛。不能約制其經血。故忽然而下。謂之崩中暴下。治宜當大補氣血之藥。舉養脾胃。微加鎮墜心火之藥。治其心。補陰瀉陽。經自止矣。

【附方】

小薊湯　治崩中不止。

小薊莖葉研取汁一盞。生苧汁一盞　白朮半兩

右三件入水一盞煎。溫服。

荊芥散　治婦人崩中。連日不止。

用荊芥穗於燈盞多著燈心。好麻油點燈。就上燒荊芥焦色。

右爲末。每服三錢。童便調下。

又方

芥葉如雞子大。　阿膠半兩。　乾姜一錢。

右爲粗末。用水五盞。先煮艾姜。後入膠烊消。分作二服。空心。

如聖散　治婦人血山崩。

棕櫚灰　烏梅各一兩。　乾姜一兩五分。並燒灰存性

右爲末。每服二錢。烏梅酒調下。空心。

涼血地黃湯　治婦人血崩。是腎水月虛。不能鎮守包絡相火。故血走而崩也。

黃芩　荊芥　蔓荊子各一分。　黃柏

知母　藁本　細辛　川芎各二分。

黃連　羌活　柴胡　升麻
防風各三分.　生芐　當歸各五分.　甘草一錢.
紅花炒.少許.

右作一服.水煎.空心稍熱服.

帶下九十

○帶下.赤屬血.白屬氣.主治燥濕爲先.漏與帶.俱是胃中痰積流下.滲入膀胱.無人知此.只宜升提.甚者上必用吐以提其氣.下用二陳湯加蒼朮、白朮.仍用丸子.一本作瓦甑子.又云.赤白帶下皆屬血.出於大腸小腸之分.肥人多是濕痰.海石、半夏、南星、炒柏、蒼朮、川芎、椿皮.一方無椿皮有青黛.瘦人白帶少.如有者多熱.以炒黃柏、滑石、椿皮、川芎、海石.如無海石.以蛤粉亦可.一方有青黛.作丸子服.赤白帶下.炒黃荊子爲末.酒調下.二錢.或米湯亦可.又治心痛.羅先生法.或十棗湯.或神佑丸.或玉燭散.皆可服.實者可行.虛者不可峻攻.血虛者.加減四物湯.氣虛者.參朮、陳皮、間與之.濕勝者.用固腸丸.相火動者.於諸藥中少加黃柏.滑者加龍骨、赤石脂.澁者加葵花.葵花.白者治白帶.赤者治赤帶.性燥者加黃連.痰氣帶下者.蒼朮、香附、滑石、蛤粉、半夏、茯苓、丸服.寒月少加乾姜.臨機應變.必須斷厚味.

【入方】

良姜　芍藥

右爲末。粥丸。每服四五十丸。空心。

又方　一婦人白帶兼風痛。

半夏　茯苓　黃柏二錢。各炒成灰。　椿樹根皮一兩半。

甘草　蒼朮　黃柏酒炒。　南星

牛膝酒洗。

治婦人上有頭風鼻涕。下有白帶。

南星　蒼朮　川芎　陳皮

半夏　川芎　柏皮炒。　滑石

酒芩　辛夷　牡礪粉炒。

右咬咀。水煎。去粗。食前服。

又方　治白帶。

龜板炙。　枳子各二兩。　黃柏炒。一兩。　白芍藥七錢半。

香附半兩。　乾姜炒。二錢半。　山茱萸　苦參

椿根皮各半兩。　貝母

右爲末酒糊丸桐子大空心米湯下五十丸

又方　治赤白帶下或時腹痛

龜板酒炙二兩　黃柏炒一兩　乾姜炒二錢　枳子二錢半

右爲末酒糊丸如桐子大每服七十丸日服二次

又方　治婦人有孕白帶

蒼朮三錢　白芷二錢　黃連炒二錢　黃芩炒三錢

黃柏炒一錢半　白芍二錢半　椿根皮炒一錢半　山茱萸二錢半

右爲末糊丸空心溫酒下五十丸

治結痰白帶　先以小胃丹半饑半飽津液下數丸候鬱積開却宜服補藥

白朮二兩　黃芩半兩　紅白葵花二錢半　白芍七錢半

右爲末蒸餅丸空心煎四物湯下三五十丸

固腸丸　治濕氣下利大便血白帶去脾胃陳積之疾用此以燥其濕亦不可單用須看病作湯使

椿根白皮性涼而燥須炒用

右爲末酒糊丸服

又方

椿根皮四兩　　滑石二兩

右爲末粥丸桐子大空心白湯下一百丸

又方　治白帶因七情所傷而脈數者

黃連炒　　扁柏酒蒸　　黃柏炒各半兩

白芍　　白朮各一兩　　椿根皮炒三兩　　香附醋炒

右爲末粥丸桐子大每服七十丸食前米飲下

又方　治赤白帶因濕勝而下者

蒼朮鹽炒　　白芍　　滑石炒各一兩　　枳殼炒

甘草各三錢　　椿根皮炒二兩　　乾姜炮二錢　　地榆半兩

右爲末粥丸空心米飲下一百丸

〔附錄〕赤白帶者皆因七情內傷或下元虛憊感非一端叔和云崩中日久爲白帶漏下多時骨本枯崩中者始病血崩久則血少亡其陽故白滑之物下流不止是本經血海將枯津液復亡枯乾不能滋養筋骨執劑之法須以本部行經藥爲引用爲使大辛甘油膩之藥潤其枯燥而滋益津液以大卒熱之氣味藥補其陽道生其血脈以寒苦之藥泄其肺而救上熱傷氣以人參補之以微苦溫之藥爲佐而益元氣此治之大法也

【附方】

戴人玉燭散　治經候不通。腹脹或痛。

當歸　芍藥　川芎　熟艽

芒硝　大黃　甘草

右㕮咀。生姜三片。煎服。

十棗湯　見脇痛類。

神佑丸　見中濕類。

產前九十一

○產前當清熱產血。產婦因火動胎、逆上作喘急者。急用條芩、香附之類爲末調下。條芩、水中取沉者爲佳。噎胎乃氣虛、血虛、血熱。黃芩安胎。乃上中二焦藥。能降火下行。益母草即茺蔚子。治產前產後諸病。能行血養血。難產可煎作膏。地黃膏、牛膝膏、皆可用。懷妊愛物。乃一臟之虛。假如肝臟之虛。肝氣止。能生胎。無餘用也。又云。不能榮其肝。肝虛故愛酸物。產前安胎。白朮、黃芩、爲妙藥也。條芩。安胎聖藥也。俗人不知。以爲害而不敢用。反謂溫熱之藥可養胎。殊不知產前宜清熱。令血循經而不妄行。故能養胎。胎熱將臨月。以三補丸加炒香附、炒白芍。蒸餅丸服。抑熱。以三補丸。用地黃膏丸。有孕八九箇月。必用順氣。須用枳殼、紫蘇梗。凡妊婦。脈細勻易產。大浮緩。火氣散。難產。生產如抱缸過壩一般。

【入方】固胎。

地黃半錢。　歸身　人參　白芍各二錢

白朮一錢半。　川芎五分　陳皮一錢。

甘草三分。　黃連少許。　黃柏少許　黃芩半錢。

一本無芩　桑上羊兒藤七葉圓者。

右咬咀。每二錢。入糯米二十四粒。煎服。血虛不安者。用阿膠。痛者。用砂仁止痛。安胎行氣故也。

束胎丸　第八箇月可服。

炒黃芩夏一兩。春秋七錢半。冬半兩。　白朮一兩。不見火。

陳皮三兩。忌火　茯苓七錢半。不見火。

右爲末。粥丸服。

達生散　又名束胎散。

大腹皮三錢。　人參　陳皮各半錢。

芍藥各一錢。　紫蘇葉半錢。　甘草炙二錢。　白朮　歸身尾一錢。

右作一服。入青葱五葉。黃楊腦七箇。此卽黃楊樹葉稍兒也。或加枳殼、砂仁。以水煎。食後服。於八九箇月服十數貼。甚得力。夏月加黃芩。冬不必加。春加川芎。或有別證。以意消息于后。

○氣虛加參朮　氣實倍香附陳皮　血虛倍當歸加地黃　形實倍紫蘇　性急加黃連　有熱加黃芩　濕痰加滑石半夏　食積加山查　食後易飢倍黃楊腦　有痰加半夏　腹痛加木香桂

又方　第九箇月服

黃芩一兩酒炒不宜涼藥怯弱者減半　白朮一兩　枳殼炒七錢半

滑石七錢半臨月十日前小便多者減此一味

右爲末粥丸桐子大每服三十丸空心熱湯下多則恐損元氣實人宜服

又方　安胎

白朮　黃芩　炒黑

右爲末粥丸服　一本云用條芩一二兩爲末每一錢或半錢濃煎白朮湯調下每次用白朮五七錢煎湯

○惡阻從痰治　多用二陳湯

戴云惡阻者謂婦人有孕惡心阻其飲食者是也肥者有痰瘦者有熱須用二陳湯

【入方】

白朮不拘多少

右爲末水丸隨所好或湯或水下

○子腫　濕多。

戴云子腫者、謂婦人手足或頭面通身浮腫者是也。

【入方】

山梔子炒用一合。

右爲末。米飲吞下。或丸服。

三因鯉魚湯　治妊娠腹大。胎間有水氣。

白朮五兩。　茯苓四兩。　當歸　芎藥各三兩。

右細剉。以鯉魚一頭。修事如食法。煮取汁。去魚不用。每服四錢。入魚汁一盞半。姜七片。陳皮少許。煎至七分。去柤。空心服。

○胎漏。氣虛。血虛。血熱。可服固孕之藥。

戴云。胎漏者、謂婦人有胎而血漏下者。

參朮飲　治妊娠轉胞。

四物湯加人參　白朮　半夏制。　陳皮　甘草

右咬咀。入生姜煎。空心服。

【附方】

治胎動不安已有所見

艾葉　阿膠　當歸　川芎各三兩

甘草一兩

右每服五錢水煎熟下膠令烊溫服

膠艾湯　損動胎去血腹痛

艾葉　阿膠

右二味水煎服

○難產氣血虛故也此蓋九月十月之際不謹守者有之亦有氣血凝滯而不能轉運者臨月時服野天麻熬膏白湯調下油蜜小便和極勻治難產

【入方】

砂仁　香附醋煮　枳殼　甘草

右爲末湯調又以香油蜜小便和勻各半盞調益母草末催生

白芷灰　百草霜　滑石

右爲末用芎、歸煎湯調下。或姜汁服。

天麻丸　易產。

天麻卽益母草。六月間連根採。陰乾。

右爲末。不拘多少。煉蜜丸如圓眼大。臨產時。溫酒或白湯化一丸。能除產後百病。

【附方】

催生如聖散

黃葵花不以多少。焙乾。

右爲末。熱湯調下二錢。神妙。或有漏血胎臟乾澁。雜產痛劇者。併進三服。良久。腹中氣寬胎滑。卽時產下。如無花。只以蜀葵子爛研小半合。以酒調。尤妙。亦治打撲傷損。如胎死不下。煎紅花溫酒調下。經驗方。用子四十九粒。或三十粒。歌曰。黃金內子三十粒。細研酒調能備急。命若懸絲在須臾。卽令眷屬不悲泣。

又方

蛇蛻一條全者。　蠶脫紙一張。一方無。

右入新瓮中。鹽泥固濟。燒存性爲末。煎楡白皮。調下一錢。三服。覺痛便產。

又方　治產難兼治胞衣不下幷死胎。

莧麻子七粒去殼研細成膏塗脚心胞衣卽下速洗去不洗腸出却用此膏塗頂上腸自縮入如神之妙

又方

臙月兔頭一枚燒灰

右爲末葱白湯調二錢立生

又方　治難產三日不下

伏龍肝細研每服一錢酒調服之　又或吞鷄子黃三箇幷少苦酒服之立生　又或用赤小豆二升水九升煮取一升汁入炙了明黃膠一兩同煎少時一服五合　又用槐子十四枚卽下　又方當歸爲末酒調方寸匕服

胞衣不下

取皂屋黑塵研爲細末酒調方寸匕

產後九十二

○產後無得令虛當大補氣血爲先雖有雜證以末治之一切病多是血虛皆不可發表　產後不可用芎藥以其酸寒伐生發之氣故也　產後血暈因虛火載血上行漸漸暈來方用鹿角燒灰出火毒研極細末好酒同童便灌下一呷卽醒行血極快　又方以韭葉細切盛於有蓄瓶中以熱醋沃之急封其口

以痞塞產婦鼻中。可愈眩冒。○產後中風。切不可作風治。必大補氣血爲主。然後治痰。當以左右手之脈。分其氣血多少而治。產後中風。口眼喎斜。切不可服小續命湯。產後水腫。必用大補氣血爲主。小佐蒼朮、茯苓使水自利。產後大發熱。必用乾姜。輕者用茯苓。淡滲其熱。一應寒苦幷發表之藥。皆不可用。產後發熱惡寒。皆屬血虛。左手脈不足。補血藥多於補氣藥。惡寒發熱腹痛者。當去惡血。腹滿者不是。產後發熱。乳汁不通及膨者。無子當消。用麥蘗二兩炒。研細末。清湯調下。作四服。有子者。用木通、通草、猪蹄煎服。凡產後有病。先固正氣。前條云。產後大熱。必用乾姜。或曰。用姜者何也。曰。此熱非有餘之熱。乃陰虛生內熱耳。故以補陰藥大劑服之。且乾姜能入肺和肺氣。入肝分。引血藥生血。然不可獨用。必與補陰藥同用。此造化自然之妙。非天下之至神。孰能與於此乎。產後脈洪數。產前脈細小澁弱。多死。懷孕者脈主洪數。已產而洪數不改者。多主死。

【入方】產後補虛。

人參　白朮一錢。　茯苓　歸身尾
陳皮　川芎各半錢。　甘草炙三分。

有熱加黃芩一錢。生姜三片。

右以水煎服。

產後消血塊方

滑石三錢　沒藥二錢　血竭二錢如無以牡丹皮代之

右爲末醋糊丸　如惡露不下以五靈脂爲末神麴丸白芍陳皮湯下　瓦壠子能消血塊

又方

血竭　五靈脂

右爲末消產後血塊極好

又方　治產後泄瀉

黃芩　白芍　川芎　茯苓

乾姜　滑石　陳皮　炒芍藥

甘草炙

右㕮咀水煎服

又方　治產後惡露不盡小腹作痛

五靈脂　香附一方加蛤粉

右爲末醋糊丸甚者入桃仁不去尖用

獨行丸　治婦人產後血衝心動及治男子血氣心腹痛有孕者忌服

五靈脂去土半炒半生

右爲末。水丸彈子大。每一丸。或酒或姜湯化下。

參朮膏　治產後胞損成淋瀝證。

人參二錢半。　白朮二錢。　桃仁　陳皮各一錢。

黃芪一錢半。　茯苓一錢。　甘草炙、半錢。

右咬咀。水煎。猪羊胞後入藥。作一服。

〔附錄〕產後血暈者。皆由敗血流入肝經。眼見黑花。頭目旋暈。不能起坐。甚至昏悶不省人事。謂之血暈。用酒調黑神散最佳。切不可作中風治之。凡血暈。皆血乘虛逆上湊心。故昏迷不省氣閉欲絕是也。古法有云。產婦纔分晚了。預燒秤鎚。或江中黃石子硬炭。燒令通赤。置器中。急於床前以醋沃之。得醋氣可除血暈。或以好醋久塗口鼻。乃置醋於傍。使聞其氣。兼細細少飲之。此爲上法也。又法。以乾漆燒烟熏產母面。即醒。無乾漆。以破漆器亦可。

【附方】

清魂散　治血迷血暈。

澤蘭葉　人參各二錢半。　荆芥一兩。　川芎半兩。

甘草二錢。

右爲末。用溫酒熱湯各半盞調一錢。急灌之。下咽即開眼。

黑神散

黑豆炒半升　熟芍　當歸　肉桂
乾姜　甘草　白芍　蒲黃各四兩

生芍別本無

右爲末每服二錢童便酒各半調服一名烏金散

子嗣九十三　附斷子法

○若是肥盛婦人稟受甚厚恣於酒食之人經水不調不能成胎謂之軀脂滿溢閉塞子宮宜行濕燥痰用星夏蒼朮台芎防風羌活滑石或導痰湯之類　若是怯瘦性急之人經水不調不能成胎謂之子宮乾澁無血不能攝受精氣宜涼血降火或四物加香附黃芩柴胡養血養陰等藥可宜　東垣有六位地黃丸以補婦人之陰血不足無子服之者能使胎孕出試効方

○斷子法用白麵麩一升無灰酒五升作糊煮至二升半濾去粗分作三服候經至前一日晚次早五更及天明各喫一服經卽不一無不字行終身無子矣

小兒九十四

○乳下小兒常多濕熱食積痰熱傷乳爲病大概肝與脾病多　小兒易怒肝病最多大人亦然肝只是有餘腎只是不足

○小兒初生未經食乳急取甘草一寸火上炙熟細切置地上出火毒一時許用水一小盞煮至三分之一去滓用新綿醮滴兒口中令嚥盡須臾吐痰及瘀血方與乳食年長知虜無病

○小兒急慢驚風發熱口禁手心伏熱痰熱咳嗽痰喘此類證並用湧法吐之重劑瓜蒂散輕劑用苦參、赤小豆末須蝦蟆汁調服之後用通聖散爲末蜜丸服間以桑樹上牛兒陰乾焙末調服以平其氣驚有二證一者熱痰主急驚當吐瀉之一者脾虛乃爲慢驚所以多死當養脾急驚只用降火、下痰、養血慢驚者先實脾土後散風邪只用硃砂安神丸更於血藥中求之

○小兒驀然無故大叫作發者必死是火大發則虛其氣故也

【入方】黑龍丸　治小兒急慢驚風

牛膽南星　青礞石焰硝等分煆各一兩　天竺黃

青黛各半兩　蘆薈二錢半　辰砂三錢　殭蠶半錢

蜈蚣一錢半燒存性

右爲末甘草煎膏丸如鷄頭大每服一二丸急驚煎姜蜜薄荷湯下慢驚煎桔梗白朮湯下

治驚而有熱者

人參　茯苓　白芍酒炒　白朮

右㕮咀姜煎夏月加黃連、生甘草、竹葉

【附方】

神聖牛黃奪命散

檳榔半兩　木香三錢　大黃二兩麵裹煨熟爲末

白牽牛一兩一半炒一半生用　黑牽牛粗末一半生用一半炒

右爲一處研作細末入輕粉少許每服三錢用蜜漿水調下不拘時候微利爲度

通聖散　見斑疹類

朱砂安神丸　見驚悸類

瓜蒂散　見疸類

○疳病或肚大筋青

胡黃連丸　治疳病腹大

胡黃連五分去果子積阿魏一錢半醋浸去肉積　神麴二錢去食積

麝香四粒　炒黃連二錢去熱積

右爲末猪膽汁丸如黍米大每服二三十丸白朮湯送下　又云胡黃連丸十二粒白朮湯下

五積丸　治小兒諸般疳積

丑頭末一兩　黃連半兩　陳皮一兩　青皮半兩

山查半兩

右炒焦黑色爲末每用巴豆霜半錢前藥末半錢宿蒸餅丸麻子大小兒二歲十丸五更姜湯下至天明大便泄爲度溫粥補之未利再服三五丸

烏犀丸

丑頭末三兩　青皮三兩　史君子肉七錢半　白蕪荑一錢半

鶴虱五錢　蘆薈一錢另研燒紅醋淬　苦練根皮半兩

右炒令焦黑色爲末麵丸麻子大每三五十丸米飲送下食前量小兒大小加減

黃龍丸

三稜三兩　黑角莪朮三兩　青皮一兩半　山查肉七錢半

乾姜七錢半

右用麵丸麻子大日晒乾食後姜湯下量兒大小加減○烏犀黃龍間服食前服烏犀食後服黃龍

肥兒丸　治小兒疳積

蘆薈另研　胡黃連三錢　炒麵四錢　黃連

白朮　山查炒半兩　蕪荑炒三錢

右爲末蘆薈末和勻猪膽汁丸粟米大每六十丸食前米飲下

疳黃食積

白朮　黃連　苦參　山查等分

右爲末麵糊丸麻子大食後白湯下十五丸

食傷胃熱重蒸

白朮一兩　半夏　黃連半兩　平胃散二兩

右用粥丸食後白湯下二十丸

〔附錄〕小兒疳病者小兒臟腑嬌嫩飽則易傷乳哺飲食一或失常不爲疳者鮮矣疳皆因乳食不調甘肥無節而作也或嬰幼缺乳粥飯太早耗傷形氣則疳之根生廷及歲月五疳病成甚者胸陷喘噦乳食直瀉腫滿下利腹脇脹疼皮發紫瘡肌肉光紫與夫疳勞瀉面稿色天骨露齒張肚硬不食者皆危篤矣凡此等類蘆扁復生難施其巧

【附方】

集聖丸　治小兒疳通用

蘆薈　五靈脂　好夜明砂炒　砂仁

陳皮　青皮　我朮煨　木香

史君子煨各二錢　黃連　蝦蟇日乾炙焦各三分

右爲末用雄猪膽二枚取汁和藥入糕糊丸麻子大每服十五丸米飲送下

大蘆薈丸　治諸疳

蘆薈　麝香　青黛

檳榔　黃連炒二錢半　蟬殼二十四枚　黃連半兩

麝香少許

右爲末猪膽汁二枚取汁浸糕爲丸麻子大每服二十丸米飲下

褐丸子　治疳腫脹

蘿卜子二兩炒　陳皮　青皮　檳榔

黑丑半熟半生　五靈脂　赤茯苓　莪朮煨各半兩

木香一錢半

右爲末麵糊丸菉豆大每服十五丸煎紫蘇葉皮湯下

○子熱

炒芍藥　香附　滑石一兩　甘草三錢

黃連二錢

右作四服水一盞半生姜三片煎乳母服

○風痰

南星一兩.切.用白礬末半兩.水泡一指厚.浸.晒乾.研細入.　白附子二兩.

右爲末.飛白麵糊丸.如芡實大.每服一二丸.姜蜜薄荷湯化下.

白附丸

牛膽星一兩.須用黃牯牛膽臘月粉南星.親手脩合風乾.隔一年用.牛膽須入三四次者佳.

大陳半夏半兩.　粉白南星一兩.切作片.用臘雪水浸七日.去水晒乾.

枯白礬二錢半

右爲末.宿蒸餅丸.如梧子大.用姜汁蜜湯送下.有熱加薄荷葉.

紫金泥　治小兒哮喘不止.端午日脩合.

黑椒四十九粒.浸透.去皮.研如泥.次入.　人言一錢.　鵝管石一錢.

右爲末.丸如黍米大.朱砂爲衣.每一丸或二丸.量兒大小.空心冷茶清下.當日忌生冷葷腥熱物.服藥病止後.更服白附丸三五貼.

○小兒腹痛.多是飲食所傷.宜

白朮　陳皮　青皮　山查

神麯　麥孽　砂仁　甘草

受寒痛者。加藿香、吳茱萸。有熱加黃芩。

小兒腹脹

蘿卜子蒸　紫蘇梗　乾葛　陳皮等分。

甘草減半。

食滅者。加朮煎服。

小兒好喫粽。成腹脹疼。用白酒麴末。同黃連末爲丸。服之愈。

又方

茯苓皮　陳皮　赤小豆　蘿卜子炒。

木通各半錢。　木香二分。　甘草些少。

右㕮咀。姜一片。煎服。

〔附錄〕小兒腹痛。多因邪正交爭、與臟氣相擊而作也。挾熱作痛者。以面赤或壯熱、四肢煩、手足心熱見之。挾冷作痛者。以面色或白或青見之。冷甚而證變。則面色黯黑。唇瓜甲皆青矣。熱證宜四順清涼飲加青皮、枳殼。冷證指迷七氣湯。冷熱不調。以桔梗枳殼湯加青陳皮、木香、當歸。

○小兒吐瀉黃疸

三稜　莪朮　青皮　陳皮

神麴炒　茯苓　麥孛　黃連
甘草　白朮
右爲末調服。傷乳食吐瀉加山查。時氣吐瀉加滑石。發熱加薄荷。
○夏月小兒吐瀉用益元散錢氏五補五瀉之藥俱可用。吐瀉腹痛吐乳調脾以平胃散入熟蜜加蘇合香丸名萬安膏用米湯化下。夏月熱病六一散最妙。

○小兒痢疾
黃連　黃芩　陳皮　甘草
右以水煎服。赤痢加紅花桃仁。白痢加滑石末。

又方　治小兒食積痢。
炒神麴　蒼朮　滑石　白芍
黃芩　白朮　甘草炙　陳皮
右㕮咀水煎下保和丸。一方加茯苓。

○小兒赤痢壯熱用藍青擣汁每服半盞與之妙。

〔附錄〕凡小兒痢疾亦作食積論。初得之時宜用木香檳榔丸下之。後用白朮、白芍藥、黃芩、甘草、滑石。如裏急後重加木香、檳榔、枳殼。久不止者用肉豆寇、粟殼炒黃。小兒赤斑、紅斑、瘡痒、癮疹並宜用防風

通聖散爲末調服。

○小兒口糜

戴云謂滿口生瘡者便是。

江茶　粉草

右爲末敷之。一方用黃丹。

又方

苦參　黃丹　五倍子　青黛

右等分爲末敷之。

又方

青黛　芒硝

右爲末敷口中。

又方

黃柏　細辛　青鹽

右等分爲末。噙之吐出涎。不過三日愈。亦治大人。治毒口瘡。五倍子、黃丹、甘草、江茶、芒硝等分爲末敷之。

○龜胸

蒼朮　酒柏　酒芍藥　陳皮
防風　威靈仙　山查　當歸

痢後加生芊

○小兒夜啼此是邪熱乘心

黃連姜汁炒一錢半　甘草一錢

右用竹葉一十片煎服　又方加人參二錢半作二服入姜一片水煎

又法夜啼不止潛取捕鷄窠草一握置小兒身下

〔附錄〕夜啼小兒臟冷也陰盛於夜則冷動冷動則爲陰極發燥寒盛作疼所以夜啼而不歇

【附方】

鈎藤散　治小兒夜啼

鈎藤　茯苓　茯神　川芎
當歸　木香各一錢　甘草炙五分

右爲末每服一錢姜棗略煎服　又燈草燒灰塗傅乳上與之

○小兒脫肛

戴云脫肛者大腸脫下之說
○脫囊卽外腎腫大
戴云脫囊者陰囊腫大墜下不收上之說或云潰爛陰丸脫出
【入方】
木通　甘草　黃連炒　當歸
黃芩炒
右以水煎服
又方　治脫肛用東北方陳壁土泡湯先熏後洗
又方　治脫囊
紫蘇莖葉爲末乾付如爛用香油調鵝翎刷又用靑荷葉包上
○小兒木舌
戴云木舌者舌腫硬不和軟也又言重舌者亦是此類二者皆是熱病
【入方】
百草霜　芒硝　滑石
右爲末酒調付之

重舌。用好膽礬研細付之。

○咯血

戴云。咯紅者。卽唾內有血。非吐血與咳血。

【入方】

黑豆　甘草

右煎服。

○小兒尿血

甘草湯調益元散、加升麻煎服。尤妙。

○小兒喫泥。胃氣熱故也。

【入方】

軟石膏　黃芩　陳皮　茯苓

白朮　甘草

右用水煎服。

又方

膩粉一錢。砂糖和丸。如麻子大。米飲下一丸。瀉出土立瘥。

○小兒解顱。乃是母氣虛與熱多耳。
戴云。卽初生小兒頭上骨未合而開者。

【入方】

四君子與四物子母皆可服。有熱加酒炒黃芩、連、生甘草、煎服。外用帛束緊。用白斂末傅之。

小兒吐蚘蟲

以苦練根爲君。佐以二陳湯。煎服。

小兒冬月吐蚘。多是胃寒胃虛所致。錢氏白朮散加丁香二粒。

【附方】

錢氏白朮散

藿香　白朮　木香　白茯苓
甘草　人參各一錢。　乾葛二錢。

右爲末。每一錢至二錢。水煎服。

○小兒口噤

治法用搐鼻方

鬱金　藜蘆　瓜蒂

右爲末水調搨之。

○小兒禿頭

用白灰燒紅淬長流水令熱洗之。內又服酒製通聖散。除大黃另用酒炒入研爲末。再用酒拌乾。每服一錢。水煎頻服。外又用胡荽子、伏龍尾、卽梁上灰塵、黃連、白礬爲末。油調傅。

又方

松樹厚皮燒灰。　黃丹水飛一兩。　寒水石一兩細研。　白礬枯。
黃連　大黃各半兩。　白膠香熬飛傾石上三兩。
輕粉四盞或云一分

右爲末。熬熟油調傅瘡上。須先洗了瘡痂傅之佳。

又方　治小兒癩頭幷身癩等證。

松皮燒灰。　白膠香　枯礬　大黃
黃柏

右爲末。用熟油調敷。

小兒頭瘡

臘猪油半生半熱。　雄黃　水銀等分

右研和勻。洗淨付瘡上。

又方

川芎　酒片芩　酒白芍
酒白朮　酒歸一兩半。　酒天麻
蒼耳七錢半。　酒柏　酒粉草四錢。

右爲末。水盞起煎服。日四五次。服後睡片時。

又方　單治頭瘡。

松樹皮厚者。燒炭二兩。白膠香熬沸傾石上二兩。
白礬火飛。半兩。　黃芩　黃連
蛇麻子　寒水石三錢。　白芷
木香少許。痛者用。　輕粉

右爲極細末。熬熟油調。敷瘡上。須洗淨瘡去痂傅之佳。

又小兒瘡

猪牙皂角去皮。　胡椒些少。　枯礬

右爲末。樟腦燭油擦。七日如櫻桃膿窠。去椒。

陳皮半兩
蒼朮
防風三錢。

黃丹一兩。火飛。
大黃各三錢。
無名異炒。少許。

輕粉

○小兒臍腫汗出

用枯白礬爲末付.或黃柏爲末付之.　又小兒臍不乾.伏龍肝塗.

○小兒天火丹臍腹起者.赤溜不妨.

蚯蚓泥炒調付.

○小兒赤溜　主傷血熱.

用生苄木通荊芥苦藥帶表之類.外以芭蕉油塗患處.芒硝濃煎汁洗之.　又方.鷄子清調伏龍肝傅之.

○小兒耳後月蝕瘡

黃連　枯白礬

右爲末傅之.

○小兒鼻赤

雄黃　黃丹

右同爲末.無根水調傅之.　又蒼耳葉酒蒸焙乾爲末.調服.最解食毒.　又鼻下一道赤者.名曰蚕.以黃連末傅之.

辛夷膏　專治小兒鼻流清涕不止.

辛夷葉一兩洗淨焙乾細辛　木通　白芷各半兩
杏仁一兩去皮研如泥木香半兩
右爲細末次用杏仁泥羊骨髓猪脂各一兩同諸藥和勻於瓦石器中熬成膏赤黃色爲度於地上放冷入腦麝各一錢拌勻塗顧門上每用少許塗鼻中
○小兒變蒸是胎毒散也
○乳兒瘡疾痞塊
川芎二錢　生苄　白芍一錢半　陳皮
半夏　炒芩一錢　甘草二分
右作一服姜三片就煎下甲末半錢
痘瘡九十五
○痘瘡分氣虛血虛用補氣虛者人參白朮加解毒藥血虛者四物湯中加解毒藥凡痘瘡初出之時色白者便用大補氣血參朮芪芎升麻乾葛草木香丁香酒洗當歸白芍若大便瀉加訶子肉豆蔻酒炒芩連名解毒藥但見紅點便忌葛根湯恐發得表虛也吐瀉食少爲裏虛不吐瀉能食爲裏實裏實而補則結癰毒陷伏倒靨爲表虛灰白者亦表虛或用燒人屎紅活綻凸爲表實表實而更復用表藥則反潰爛不結痂吐瀉陷伏二者俱見爲表裏俱虛黑陷甚者亦用燒人屎蜜水調服出子和方

痘瘡初出時或未見時人有患者宜預服此藥多者令少重者令輕方以絲瓜近蒂三寸連皮子燒灰存性爲末砂糖拌乾喫入硃砂末尤妙　痘瘡分人清濁就形氣上取勇怯　黑陷二種因氣虛而毒氣不能盡出者酒炒黃芪酒紫草人參　顏色正者如上治將欲成就却色淡者宜助血藥用當歸川芎酒洗芍藥之類或加紅花　將成就之際却紫色者屬熱用涼藥解其毒升麻葛根黃連黃芩桂枝連翹之類甚者犀角大解痘毒　爐灰白色靜者怯者作寒看　勇者燥者煩發者作熱看　痘瘡鼠粘子連翹山查甘草此四味始終必用之藥　全白色將靨時如豆殼者蓋因初起時飲水多其靨不齊俗呼倒靨不好但服實表之劑消息以大小便如大便秘通大便小便秘通小便　有初起煩燥譫語狂渴引飲若飲水則後來靨不齊急以涼藥解其標如益元散之類亦可服　痒塌者於形色脈上分虛實實則脈有力氣壯虛則脈無力氣怯　輕者用淡蜜水調滑石末以羽潤瘡上　虛痒者以實表之劑加涼血藥實痒如大便不通者以大黃寒涼之藥少許與之下其結糞　疎則無毒蜜則有毒宜涼藥解之雖數十貼亦不妨無害眼之患　瘡乾者宜退火濕者用瀉濕退火止用輕劑荊芥升麻葛根之類瀉濕乃肌表間濕宜用風藥白芷防風之類　如痘瘡傷眼必用山梔決明赤芍歸尾芩連防風連翹升麻桔梗作小劑末調服如眼無光過百日後血氣復自明　痘癮多是實毒血熱成癮分上下用藥一日不可緩已成膿必用涼藥爲主赤芍甘草節連翹桔梗　上引用升麻葛根下引用檳榔牛膝助以貝母忍冬草白芷瓜蔞之類　大便燥用大黃發寒熱用黃芩黃柏　痘瘡黑屬血熱涼血爲主　白屬氣虛補氣爲主

中黑陷而外白起得遲者。則相兼而治。初起時自汗不妨。蓋濕熱薰蒸而然故也。痘風分氣血虛實。以日子守之。多帶氣血不足。虛則黃芪生血活血之劑助之。略佐以風藥。實則白芍爲君。黃芩亦爲君。佐以白芷、連翹、續斷之類。若屬寒。陳氏方可用。

【入方】解痘瘡毒。

絲瓜　升麻　酒芍藥　生甘草
黑豆　山查　赤小豆　犀角

右水煎服。

又方　治痘瘡已出未出皆可服。

硃砂

右爲末。蜜水調服。多者可減。少者可無。

痘瘡敷藥

貝母　南星　殭蠶　天花粉
寒水石最多。　白芷　草烏　大黃
猪牙皂角

右爲末。醋調付之。

〔附錄〕小兒瘡疹大抵與傷寒相似發熱煩燥臉赤唇紅身痛頭疼乍寒乍熱噴嚏呵欠嗽喘痰涎傷寒證候類有之始發之時有因傷風寒而得者有時氣傳染而得者有因傷食嘔吐而得者有因跌撲驚恐蓄血而得者或爲窠眼禁牙驚搐如風之證或口舌咽喉肚腹疼痛或煩燥狂悶昏睡或自汗或下痢或發熱或不發熱證候多端卒未易辨亦須以耳冷凮冷足冷驗之蓋謂瘡疹屬陽腎臟無證耳與凮足俱屬於腎故腎之所部獨冷疑似之間或中或否不若視其耳後有紅脈赤縷爲眞於此可以稽驗矣調護之法首尾俱不可汗下但溫涼之劑兼而濟之解毒和中安表而已如欲解肌乾葛紫蘇可也其或小兒氣實煩燥熱燄大便秘結則與犀角地黃湯或人參敗毒散輩又或紫草飲多服亦能利之故前說大便不通者少與大黃尤宜仔細斟酌之愼之可也若小便赤少者分利小便則熱氣有所滲而出凡熱不可驟遏但輕解之若無熱則瘡又不能發也○凡已發未發並與紫蘇飲爲當虛者益之實者損之冷者溫之熱者平之是爲權度借喻而言亦如庖人籠蒸之法但欲其鬆耳如苟妄汗則榮衞既開轉增瘡爛妄下則正氣內脫變而歸腎身體振寒耳凮反熱眼合肚脹其瘡黑壞十無一生錢氏云黑陷青紫者百祥丸下之不黑者謹勿下余知其所下者瀉膀胱之邪也又云下後身熱氣溫欲飲水者可治水穀不消或寒戰者爲逆余知其脾强者土可以治水也百祥丸太峻當以宣風散代之瀉後溫脾則用人參茯苓白朮等分厚朴木香甘草各半爲妙蓋瘡發肌肉陽明主之脾土一溫胃氣隨暢獨不可消勝已泄之腎水乎此錢氏不刊之秘旨也　朱氏曰瘡疹已發未發但不可疎轉

此爲大戒。又曰。瘡疹首尾。皆不可下。輒用利藥。則毒氣入裏殺人。以此觀之。瘡疹證狀。雖與傷寒相似。而瘡疹治法。實與傷寒不同。傷寒所傳。從表入裏。瘡疹所發。從裏出表。蓋毒根於裏。若下之。則內氣一虛。毒不能出而返入焉。由是土不勝水。黑陷者有之。毒發於表。若汗之。則榮衞一虛。重令開泄。轉增瘡爛。由是風邪乘間變證者有之。汗下二說。古人所深戒也。調解之法。活血調氣。安表和中。輕清消毒。溫涼之劑。二者得兼而已。溫如當歸、黃芪、木香輩。涼如前胡、乾葛、升麻輩。佐之以川芎、芍藥、枳殼、桔梗、羌活、木通、紫草、甘草之屬。則可以調適矣。但小兒凡覺身熱。證似傷寒。未經瘡痘。疑似未明。且先與惺惺散、參蘇飲。或人參羌活散輩。熱甚則與升麻葛根湯。人參敗毒散。瘡痘已出。則少與化毒湯。○出不快者。加味四聖散、紫草飲子、紫草木香湯、紫草木通湯。或快班散、絲瓜湯。出太甚者。人參敗毒散、犀角地黃湯。小便赤澁者。大連翹湯、甘露飲、麥門冬五苓散。大便秘結。內煩外熱者。小柴胡湯、加枳殼最當。或少少四順清涼飲。若咽喉痛者。大如聖湯、鼠粘子湯。喘滿氣壅者。麻黃黃芩湯。胸腹脹滿者。枳殼桔梗湯、二陳加枳殼湯。煩渴者。甘草散、烏梅湯。下利嘔逆者。木香理中湯、甘草乾姜湯。陷入者。加味四聖散。更以胡荽酒薄傅其身。厚傅其足。噴其衣服。併以厚綿蓋之。若猶未也。獨聖散入麝香老酒調劑。或不用酒。則木香煎湯。若其瘡已黑。乃可用錢氏宣風散加青皮主之。然而瘡疹用藥。固有權度。大小二便不可不通。其有大便自利。所下黃黑。則毒氣已減。不必多與湯劑。但少用化毒湯可也。或不用亦可。若大小二便一或閉焉。則腸胃壅塞。脉絡凝滯。毒氣無從而發泄。眼閉

聲啞肌肉黧然不旋踵而告變矣其壞瘡者一曰內虛泄瀉一曰外傷風冷三曰變黑歸腎春夏爲順秋冬爲逆凡痘瘡初出之時須看胸前若稠密急宜消毒飲加山查黃芩酒洗紫草減食加人參凡痘瘡初欲出時發熱鼻尖冷呵欠咳嗽面赤方是痘出之候便宜服升麻葛根湯加山查大力子其瘡稀疎而易愈凡痘瘡發熱之時便宜惡實子爲末蜜調貼顧門上免有患眼之疾近世小兒痘瘡上黨陳文中木香散異攻散殊不知彼時立方之時爲運氣在寒司天時令又值嚴冬大寒爲因寒氣鬱遏痘瘡不紅綻故用辛熱之劑發之今人不分時令寒熱一概施治誤人多矣時值溫熱山野農家貧賤之人其或偶中也

【附方】

犀角地黃湯

犀角一兩　生苄二兩　赤芍三分　牡丹皮一兩

右咬咀三歲兒三錢水煎

人參敗毒散

人參　茯苓　甘草炙　前胡

川芎　羌活　濁活　桔梗

柴胡已上並去苗蘆　枳殼麵炒去穰各半兩

右爲粗末。每服二錢。水一盞。姜二片。薄荷少許。煎。溫服。

紫草飮子

紫草一兩。

右剉細。百沸湯大椀沃之。蓋定勿令氣出。逐旋溫服。紫草能導大便。發出亦輕。

百祥丸

紅牙大戟。不以多少。陰乾。漿水煮極軟。去骨。日中曝乾。復內元汁中煮。汁盡焙爲末。水丸。如粟米大。每服一二十丸。研赤脂麻湯下。無時。

宣風散

檳榔二箇。　陳皮　甘草各半兩。　黑丑四兩。半生半熟。

右爲末。每一錢。量大小與服。蜜湯調下。

惺惺散　治小兒風熱。及傷寒時氣瘡疹發熱。

白茯苓　細辛　桔梗　瓜蔞根

人參　甘草炙。　白朮　川芎等分。

右爲末。每一錢。水煎。入薄荷三葉同煎。服。

參蘇飮

前胡　人參　蘇葉　乾葛
半夏湯泡七次姜汁制茯苓　枳殼　陳皮
甘草　桔梗
右剉姜棗煎微熱服

人參羌活散　羌活　獨活　柴胡　人參
川芎　枳殼　茯苓各半兩　前胡
北梗　天麻　地骨皮　甘草炙各二錢半
加麻黃薄荷葱白煎服汗後尚熱宜服此去麻黃加紫草如已見三五點加紫草陳皮赤芍使熱退瘡出亦輕更調辰砂末半錢以制胎毒

升麻葛根湯　乾葛　升麻　白芍　甘草炙各四兩
右粗末每服四錢水一盞半煎一盞溫服

化毒湯　瘡痘已發以此消毒
紫草苴半兩　升麻　甘草

右剉散。每服二錢。糯米五十粒同煎服。

加味四聖散

紫草　木通　黃芪　川芎

木香等分　甘草炙減半。

右爲粗末。水煎。大便秘。加枳殼。大便如常。加糯米百粒。楊氏曰。糯米能解毒發瘡。

紫草木香湯　治瘡出不快。大便泄痢。

紫草　木香　茯苓　白朮等分。

甘草炙少許。

入糯米煎服。楊氏云。紫草能利大便。白朮、木香佐之。

紫草木通湯

紫草　人參　木通　茯苓

糯米等分。　甘草減半。

右剉。煎二錢。溫服。內虛大便利者。可入南木香。去紫草。

快斑散

紫草　蟬殼　人參　白芍各一分。

木通一錢。　甘草炙、半錢。

右剉散。煎二錢。溫服。

又方

紫草茸五錢。　陳皮二錢。　黃芪三錢。　赤芍五錢。

甘草炙三錢。

右剉。加糯米百粒。煎。三歲已上服三錢。已下一錢。服後瘡徧勻四肢。住服。

絲瓜湯

絲瓜連皮燒存性爲末。湯調。楊氏云。發痘瘡最妙。或加甘草、紫草。

大連翹湯

連翹　瞿麥　荊芥　木通

車前　當歸　防風　柴胡

赤芍　滑石　蟬蛻　甘草炙、各一錢。

黃芩　山梔子各半錢。

右剉。每服加紫草煎。

甘露飲子

生芐　熟芐　天門冬去心、麥門冬去心、
枇杷葉去毛、枳殼麩炒去穰、黃芩　石斛
山茵陳　甘草炙、各等分、
右剉、每二錢、水一盞、煎八分、食後服、
五苓散　見中暑類、
小柴胡湯　見瘧類、
四順清涼飲
當歸　赤芍　大黃虛者煨、實者生、甘草
一方加陳皮糯米煎、
如聖飲子
桔梗　甘草生、鼠粘子炒、各二錢、麥門冬三錢、
右末、竹葉煎、二三錢、一方加荊芥、防風、重者竹瀝同煎、
鼠粘子湯
鼠粘子炒、四錢、荊芥穗二錢、甘草一錢、防風半錢、
右爲細末、沸湯點服、去防風、名消毒散、

麻黃黃芩湯

麻黃三錢。　赤芍　黃芩各二錢半。　甘草炙

桂枝各半錢。

右爲粗末煎。

桔梗枳殼湯

枳殼　桔梗各二兩

右剉。姜煎。

甘草散

甘草炙。　瓜蔞根等分。

右爲末煎。服一錢。

烏梅湯

小黑豆　蔡豆各一合。　烏梅二箇

右咬咀。新汲水一椀。煎取清汁。旋服。

木香理中湯　見寒類。

本方中加木香、甘草、乾姜。

獨聖散

牛旁子炒五錢　白殭蠶二錢半

右末入紫草三莖煎連進三服其痘便出

又方

穿山甲、湯洗淨炒焦黃爲末每服半錢入麝少許木香煎湯調下或紫草煎湯入紅酒少許調

犀角消毒飲

惡實四兩炒　甘草炙一兩　防風半兩　荊芥穗二兩

右爲末煎紫草糯米園荽子湯調食後臨睡日三

論倒倉法九十六

○倒倉法治癩勞蟲癩等證推陳致新扶虛補損可吐可下用黃色肥牯牛腿精肉二十斤或十五斤順取長流急水於大鍋內煮候水耗少再添湯不可用冷水以肉爛成粗爲度濾去粗用肉湯再熬如琥珀色隔宿不喫晚飯大便秘者隔宿進神芎丸不秘者不用五更於密室不通風處溫服一鍾伺膈間藥行又續續服至七八鍾病人不欲服強再與之必身體皮毛皆痛方見吐下寒月則重湯溫之病在上欲吐多者須疎服又不可太緊恐其不納病在下欲利多者須疎服又不可太疎恐其不達臨時消息大抵先見下方可使吐須極吐下伺其上下積俱出盡在大便中見如胡桃肉狀無臭氣則止吐利後或渴不得

與湯。其小便必長。取以飲病者。名曰輪廻酒。與一二椀。非惟可以止渴。抑且可以滌濯餘垢。睡一二日。覺飢甚。乃與粥淡食之。待三日後。始與少菜羹自養。半月覺精神渙發。形體輕健。沉痾悉定矣。大概中間飲至七八鍾時。準刀經涉經絡骨節。搜逐宿垢。正邪寧不牴牾。悉有急悶。似痛非痛。自有惡況。此皆好消息。邪不勝正。將就捻耳。尤須寧耐忍受。又於欲吐未吐、欲泄未泄交作。皆有惱括意思。皆須歡喜樂受。一以靜處之。此等有大半日景象。不先說知。使方寸瞭然。鮮有不張皇者矣。未行此法前一月。不可近婦人。已行此法半年不可近婦人。五年不可喫牛肉。性急好淫不守禁忌者。皆不可行此法。倒倉全在初起三鍾慢飲最緊要。能行經隧中去。

法曰。腸胃爲市。以其無物不有。而穀爲最多。故曰倉。倉、積穀之室也。倒者、傾去積舊而滌濯使之潔淨也。經曰。胃爲受盛之官。故五味入口。卽入於胃。留毒不散。積聚既久。致傷沖和。諸病生焉。今用黃牯牛肉。其義至矣。夫牛、坤土也。黃、上之色也。以順爲德。而效法乎健。以爲功者。牡之用也。肉者、胃之樂也。熟而爲液。無形之物也。橫散入肉絡。由腸胃而滲透肌膚毛竅。爪甲無不入也。積聚久則形質成。依附腸胃。回薄曲折處。以爲柄泊之窠舊。阻礙津液。血熏蒸燔灼成病。自非剖腸刮骨之神妙。孰能去之。又豈合勺珠兩之丸散。所能竄犯其藩牆戶牖乎。夫牛肉全重厚和順之性。潤枯澤槁。豈有損也。其方出於西域之異人。人於中年後行一二次。亦卻疾養壽之一助也。

論吐法九十七

○凡藥能升動其氣者皆能吐．如防風、山梔、川芎、桔梗、芽茶．以生姜汁少許．醋少許．入蘿汁搗服．以鵝翎勾引之．附子尖、桔梗蘆、人參蘆、瓜蒂、藜蘆砒、不甚用．艾葉、牙茶．此皆自吐之法．不用手探．但藥但湯皆可吐．吐時先以布苔膊勒腰腹．於不通風處行此法．一法．用蘿蔔子五合擂入漿水濾過．入清油白蜜少許．旋半溫．用帛緊束肚皮．然後服．以鵝翎探吐．其鵝翎．平時用桐油浸．皂角水洗．晒乾待用．又法．用鍜帶殼半斤．入醬葱姜等料物煮汁．先喫鍜．後飲汁．以鵝翎勾引即吐．必須緊勒肚腹．又法．苦參末、赤小豆末各一錢．蘿汁調．重則宜用三錢．吐法．取逆流水．益元散、吐濕痰．白湯入鹽．方可吐．人參蘆煎湯．吐虛病．凡吐．先飲二椀．隔宿煎桔梗半兩．陳皮二錢．甘草二錢．凡吐不止．麝香解藜蘆瓜蒂．葱白湯亦解瓜蒂．甘草摠解諸藥．白水摠解．

充按三法中．惟湧劑爲難用．有輕重卷舒之機．汗下則一定法也．故先生特註吐爲詳者．恐人不深造其理．徒倉皇顚倒．反有害於病耳．今摠列諸法于此．使臨病隨機應變．披卷瞭然．不必搜檢而便於施治也．

救急諸方九十八

魚骨鯁．用砂糖、白炭皮末、紫蘇葉、滑石末、和丸．含口中．津液嚥下．骨自下．

蕈毒．用木香、青皮等分．作湯飲之．

衆藥毒．用五倍子二兩．重研細．用無灰酒調服．毒在上即吐．在下即瀉．

解一切毒。

用粉草五兩重細切。微炒搗細。量病人喫得多少酒。取無灰酒一處研。去粗。溫服。須臾。大吐瀉。毒亦隨去。雖十分渴。不可飲水。飲水難救。

解九里蜂。用皂角鑽孔。貼在蜂叮處。就皂莢孔上。用艾灸三五壯。卽安。

天蛇頭　用落蘇卽金絲草、金銀花藤五葉、紫葛、天蕎麥切碎。用十分好醋濃煎。先熏後洗。

又方　用人糞雜黃泥搗之。裹在患處。卽安。

又方　用撲蛇燒爲炭存性。地上出火毒。研爲細末。用香油調傅。如洗。只用井花水。

天火帶　用白鱓泥炒研細。香油傅之。

又方　雉鷄毛及鵝毛燒灰傅之。用香油調。

治蜈蚣全蝎傷　方同九里蜂灸法。

治一切蛇咬　用金線重樓水磨少許。付咬處。又爲細末。酒調飲。

又方　柏樹葉、魚胎草、皺面草、草決明、一處研細。傅咬處佳。

中牛馬肉毒　方同解一切毒法。

狗咬　以紫蘇口嚼碎塗之。

風狗咬　取小兒胎髮、炒新香附、野菊花、研細。酒調服。盡醉。

拾遺雜論九十九

○小便黃。用黃柏。澁者數者。或加澤瀉。又云。小便不利。黃柏、知母爲君。茯苓、澤瀉爲使。若濕熱流注下焦。小便赤黃。兼之澁滯。用黃柏、澤瀉甚當。若稟受甚壯、酒食過度、寡慾無慮之人。小便澁滯不利。莖中痛甚。却不宜用寒涼藥併滲利之藥。只宜升麻、柴胡、羌活、甘草梢。服後却用鵝翎探而入。嘔吐數十聲。其小便自通。若是下焦無血。小便澁數而赤。宜四物加黃柏、知母、牛膝、甘草梢。

○凡用引經藥。正藥六兩。引經藥只可用半兩。白臘屬金。藥收斂堅凝之氣。外科之要藥。生肌止血。定痛接骨。續筋補虛。與合歡樹皮、同入長肌肉膏藥用之神效。

○凡制玄明粉、朴硝一斤。蘿蔔一斤。同煮。蘿蔔熟爲度。取出。用白皮紙濾在瓷器中。露一宿收之。冬月可制。

○凡治上升之氣。大概用香附、黃連、黃芩、山梔。

○凡補中氣藥。必多服而效遲。刼藥必速效。如汗下之法。

○自芍藥酒浸炒、與白朮同用則補脾。與川芎同用則瀉肝。與參朮同用則補氣。能治血虛腹痛。餘腹痛。皆不可用。

○凡面黑人、不可多服黃芪。以其氣實而又補之也。面白人不可多發散。以其氣虛而又虧之也。面白人不可飲酒。以酒耗血故也。氣實人因服黃芪過多喘者。用三拗湯以泄其氣。

○用椒葉升起胃氣之後。胸中滿悶。舊有痰之故。以二陳加白朮、香附、炒麴。

○二陳湯治濁。加升提之藥。能使大便潤而小便長。

○腰曲不能伸者。針人中妙。

○惡寒久病。亦可解鬱。

○中焦有食積與痰而生病者。胃氣不虛。卒不便死。

○人有病。面皮上忽見紅點者。多死。

○凡治病。必先問平日起居飲食如何。

○氣屬陽。無寒之理。上升之氣。覺惡寒者。亢則害。承乃制故也。

○人臥則氣浮於肺。

○凡治病。必先固正氣。

○升降浮沉。卽順之。此必先歲氣。毋伐天和。

○寒熱溫涼。則逆之。以寒治熱之法。

○凡看脈。如得惡脈。當覆手取。如與正取同。乃元氣絕。必難治矣。如與正取不同者。乃陰陽錯綜。未必死。

○弦堅之脈。雖是有積。亦帶陰虛。脈無水、不軟之意。脈緊指者。其氣大虛。多死。峻補氣。無水、參朮歸之類。形脫者。必補氣。參朮　面白補氣　肥人補氣。

○針法渾是瀉而無補。妙在押死其血氣則不痛。故下針隨處皆可。

○灸法有補瀉火。若補火艾炷至肉。若瀉火。不要至肉便掃除之。用口吹風主散。

○點三里穴。隨意依古法點。但趺陽脈不應即是穴。蓋三里屬陽明經也。

○灸瘡不收口。用黃連、甘草節、白芷、黃丹、香油煎膏貼。

○一婦人十九歲。氣實多怒。事不發。一日忽大叫而欲厥。蓋痰閉於上。火起於下而上衝。始用香附五錢。生甘草三錢。川芎七錢。童便姜汁煎服。又用青黛、人中白、香附末為丸。稍愈。不除。後用大吐乃安。吐後用導痰湯加姜炒黃連、香附、生姜煎下龍會丸。

○狐臭用硇砂、密陀僧、明礬、銅青、白附子、辰砂為末。先以皂角水洗二三次。後傅上。不過三次全好。又方加黃丹、水銀。用白梅肉為丸擦之。又方飛黃丹、密陀僧、枯礬以蒸餅醮藥擦之。

○治赤遊風。用二蠶沙炒研細。用剪刀草根、自然汁調勻。先塗腹了。却塗患處。須留一面出處。患處移動為效。剪刀草根即野茨菇。

○金釵石斛。每二錢洗淨。生姜一片。擂細。水盞起煎。沸去柤。食前飲之。補脾清肺甚妙。

○酒風多搐。用白朮半兩。人參二錢半。甘草三錢。陳皮、蒼朮、天麻細切。酒侵白芍一錢。酒侵防風、川芎一錢半。若小便多加五味子。右為末。作丸服。

秘方一百

清六丸　治三焦濕。止泄瀉、產後腹痛、幷自利者。以補脾補血藥送之。治血痢效。

六一散一料　紅麴炒半兩

右爲末。陳倉米飯丸。並不單用。與他丸同行。又加五靈脂一兩。名靈脂丸。能行血。

參萸丸　治濕而帶氣者。濕熱甚者。用之爲向導。上可治酸。下可治自利。

六一散一料　吳茱萸一兩製

右爲末。飯丸。若去茱萸加乾姜半兩。名溫清丸。治痢效。

固腸丸　見婦人類。

補脾丸　有脾虛而惡湯藥者。製此丸。用湯吞。省口苦而易於從也。

白朮半斤　蒼朮三兩　茯苓　陳皮各三兩

芍藥半兩

右爲末。粥糊丸。加潤下丸。可作催生用。上熱甚者。加清金丸。尤妙。與此藥必無產患。

白朮丸

白朮一兩　芍藥半兩

冬月不用芍藥。加肉豆寇。泄者炒丸服。　右爲末。粥丸。〇一方。枯礬、半夏、各一錢半。

潤腸丸　能潤血燥、大便不通。

麻子仁　當歸　桃仁　生苄

枳殼各一兩

右爲末密丸

同令丸　瀉肝火行濕爲之反佐開痞結治肝邪可助補脾藥

黃連六兩　茱萸一兩

右爲末粥丸　一方名左金丸治肺火茱萸或半兩水丸白湯下

抑青丸　瀉肝丸　方見脇痛類

龍會丸　瀉肝火治脇痛　方見脇痛類

清金丸　瀉肺火熱嗽　方見嗽類

清化丸　治熱嗽　方見嗽類

咽酸方　方見吞酸類

黃連清化丸

黃連一兩　吳茱萸浸炒一錢　桃仁二十四箇研　陳皮半兩

半夏一兩半

右爲末神麯糊丸棊豆大每服百丸姜湯下

加減補陰丸

熟芋八兩　兔絲子四兩鹽酒浸一宿　當歸三兩酒浸
白芍三兩炒　瑣陽三兩酥炙　杜仲二兩炒　牛膝四兩酒浸
破故紙　枸杞一兩半　虎骨二兩酥炙　龜板一兩酥炙
黃柏二兩炒　山藥　人參　黃芪各二兩

冬加乾姜一兩

右爲末猪骨髓入蜜丸桐子大空心服一百丸鹽湯下

又方

白朮　白芍　人參　蓮肉
知母　黃柏等分

右爲末糊丸朱砂爲衣服法如前

清膈丸

黃芩半斤酒浸炒黃　南星四兩生用　半夏湯洗七次

右爲末姜糊丸

寬中丸　治胸膈痞悶停滯飲食

山查不以多少蒸熟晒乾。

右爲末作丸服。

溫清丸　治翻胃伐肝邪。

乾姜一兩。　滑石　甘草各二兩。

右爲末丸服。

大安丸　脾經消導之藥。

山查二兩。　神麴炒。　半夏　茯苓各一兩。

陳皮　蘿蔔子　連翹各半兩。　白朮二兩。

右爲末粥糊丸服。

右丹溪秘撰方已散於各種甚多如阿魏丸、保和丸、小胃丹、越鞠丸、大補丸、參朮飲、束胎丸、達生散等及諸秘法不及一一重錄姑舉此數方以表其用藥之旨大抵治法以氣、血、痰爲主凡病血虛、四物氣虛、四君子有痰、二陳酌量輕重加入主病引經之藥一循活法不執專方學者推此求之則達其蹊徑矣。

附錄

故丹溪先生朱公石表辭

宋太史濂撰

丹溪先生既卒。宗屬失其所倚藉。井邑失其所依憑。嗜學之士失其所承事。莫不彷徨遙慕。至於洒涕。濂聞之中心尤摧咽不自勝。蓋自加布于首。輒相親於几杖間。訂義質疑。而求古人精神心術之所寓。先生不以濂爲不肖。以忘年交遇之。必極言而無所隱。故知先生之深者。無踰於濂也。方欲聚厥事行。爲書以傳來世。而先生之子玉汝、從子嗣汜、忽踵濂門。以先生從弟無忌所爲狀、請爲表以勒諸墓上。濂何敢辭。先生諱震亨。字彦脩。姓朱氏。其先出於漢槐里令雲之後。居平陵。至晉永興中。臨海太守汎。始遷今婺之義烏。子孫蟬聯多發聞於世。郡志家乘載之爲詳。當宋之季。有東堂府君者。諱良祐。懿然君子人也。蓋以六經爲教。以弘其宗。府君生某。某生迪功郎桂。迪功生鄉貢進士瓌。先生之大父也。父諱元母某氏。先生受資爽朗。讀書卽了大義。爲聲律之賦。刻燭而成。長老咸器之。已而棄去。尙俠氣。不肯出人下。鄉之右族咸陵之。必風怒電激。求直于有司。上下搖手相戒。莫或輕犯。時鄉先生文懿許公講道東陽八華山中。公上承考亭朱子四傳之學。授受分明。契證眞切。擔簦而從之者亡慮數百人。先生歎曰。丈夫所學。不務聞道。而唯俠是尙。不亦惑乎。乃摳衣往事焉。先生之年。蓋已三十六矣。公爲開明天命人心之秘。內聖外王之徽。先生聞之。自悔昔之沉冥頹濟。汗下如雨。由是日有所悟。心扃融廓。體膚如覺增長。每宵挾朋坐至

四鼓。潛驗默察。必欲見諸實踐。抑其疏豪。歸於粹夷。理欲之關。誠僞之限。嚴辨確守。不以一毫苟且自恕。如是者數年。而其學堅定矣。歲當賓興。先生應書秋闈。幸沾一命。以驗其所施。再往再不利。復歎曰。不仕固無義。然得失則有命焉。苟推一家之政。以達於鄉。黨州閭。寧非仕乎。先是府君置祭田三十餘畝。合爲一區。嗣人遞司穡事。以陳時薦。然有恆祭而無恆所。先生乃即適意亭遺址。建祠堂若干楹。以奉先世神主。歲時行事。復考朱子家禮而損益其儀文。少長咸在。執事有恪。深衣大帶。以序就列。宴私洽比。不愆於禮。適意亭者。府君所造。以延徐文清公之地。先生弗忍其廢。改創祠堂之南。俾諸子姓肄習其中。包銀之不下。州縣承之。急如星火。一里之間。不下數十姓。民莫敢與辨。先生所居里。僅上富氓二人。郡守召先生自臨之曰。此非常法。君不愛頭乎。先生笑曰。守爲官。頭固當惜。民不愛也。此害將毒子孫。必欲多及民願倍蓰吾產當之。守雖怒。竟不能屈。縣有暴丞。好諂瀆鬼神。欲脩岱宗祠以徼福。懼先生莫己與。以言嘗之曰。人之生死。嶽神實司之。欲治其宮。孰敢干令。先生曰。吾受命于天。何庸媚土偶爲。生死計耶。且嶽神無知。則已使其有知。當此儉歲。民食糠覈不飽。能振吾民者。然後降之福耳。卒罷其事。賦役無藝。胥史高下其手。以爲民奸。先生集同里之人。謂曰。有田則科徭。隨之君等入胥史餌而護相傾。非策之上也。宜相率以義。絜其力之腴。贏而敷之。衆翕然從。每官書下。相依如父子。議事必先集。若苛斂之至。先生即以身前。辭氣懇款。上官多聽。爲之損裁。縣大夫勸耕于鄉。將有要於民。先生慝其臨境。邪幅扉屨。往迎于道左。大夫驚曰。先生何事。乃爾耶。先生曰。民有役于官。禮固應爾。大夫曰。勸耕善乎。先生曰。私田不煩官勸。第公

田生青芻耳。是時圭田賦重。種戶多逃亡。故先生以此爲風。大夫一笑而去。鄉有蜀墅塘。周圍凡三千六百步。溉田至六千畝而嬴。堤壞而水竭。數以旱告。先生倡民興築。置坊庸。鑿爲三竇。時其深淺而舒洩之。民食其利。後十年。山水暴至。堤又壞。先生命再從子潭力任其事。以嗣其成。縣令長或問決獄得失。先生必盡心爲之開導。東陽郭氏父子三人虐歐小民。幾斃。又貫鍼鮑腹。逼使吞之。事移義烏鞫問。當其子父皆死。先生曰。原其故殺之情。亦一人可償爾。一子從父之令。宜從未減。若皆殺之。無乃已重乎。事上從先生議。張甲行小徑中。適李乙荷任器來。幾中甲目。甲怒拳其耳而死。甲乙皆貧人。甲又有九十之親。先生曰。貰甲罪則廢法。狥法甲必瘐死。親無以養。亦死。乙屍暴於道。孰爲藏之。不若使竟其葬。亟且慰其親。徐來歸獄。服中刑耳。或曰。甲或逃奈何。先生曰。若以誠待之。必不爾也。縣如先生言。後會赦免。細民有斬先生丘木者。先生訊之。民弗服。先生聞于縣。將逮之。人交讓民曰。汝奈何犯仁人耶。民曰。計將安出。人曰。先生長者也。急舁木還之。當爾貸。民從之。先生果寘而不問。先生客吳妙湛院尼刻木作人形。以爲厭蠱。館客陳庚得之。欲發其事。尼懼。甚先生知之。以計紿陳出碎其木刻。陳歸怒且詈。先生徐曰。君乃士人。獲此聲於吳楚間。甚非君利。儻乏金吾財可通用。勿憂也。尼後輦金帛爲謝。先生叱而去。方嶽重臣及廉訪使者。聞先生名。無不願見。既見。無不欲交章薦之。先生皆力辭。唯民瘼吏弊。必再三懇額告之。不啻親受其病者。覃懷鄭公持節浙東。尤敬先生。以尊客禮禮之。衆或不樂。競短其行於公。公笑曰。朱聘君盛舉諸公之長。而諸公顧反短之。何其量之懸隔耶。皆慚不能退。初先生壯齡時。以母夫人病脾。頗習醫。後益研礪

之且曰吾既窮而在下澤不能致遠其可遠者非醫將安務乎時方盛行陳師文裴宗元所定大觀一百九十七方先生獨疑之曰用藥如持衡隨物重輕而爲前却古方新證安能相值乎於是尋師而訂其說渡濤江走吳又走宛陵走建業皆不能得復回武林有以羅司徒知悌爲司者知悌字子敬宋寶祐中寺人精於醫得金士劉元素之學而旁參於李杲張從正二家然性倨甚先生謁焉十往返不能通先生志益堅日拱立於其門大風雨不易或告羅曰此朱彥修也君居江南而失此士人將議君後矣羅遽脩容見之一見如故交爲言學醫之要必本於素問難經而濕熱相火爲病最多人罕有知其祕者兼之長沙之書詳於外感東垣之書詳於內傷必兩盡之治疾方無所憾區區陳裴之學泥之且殺人先生聞之夙疑爲之釋然學成而歸鄉之諸醫始皆大驚中而笑且排卒乃大服相推尊願爲弟子四方以疾迎候者無虛日先生無不即往雖雨雪載途亦不爲止僕夫告補先生諭之曰疾者度刻如歲而欲自逸耶窶人求藥無不與不求其償其困阨無告者不待其招注藥往起之雖百里之遠弗憚也江浙省臣往討閩寇深入瘴地遂以病還錢塘將北歸先生脈之曰二十日死使道經三衢時召吾可使還燕然ず不能生之也如期卒於姑蘇驛權貴人以微疾來召危坐中庭列三品儀衛於左右先生脈已不言而出或追問之先生曰三月後當爲鬼猶有驕氣耶及死其家神先生之醫載粟爲壽先生辭之一少年病熱兩顴火赤不能自禁躁走于庭將蹈河先生曰此陰證也製附子湯飲之衆爲之吐舌飲已其疾如失先生治療其神中若此甚多門人類證有書茲不詳載先生孤高如鶴挺然不羣雙目有小大輪日出明雖毅然之色

不可凌犯而清明坦夷。不事表儀。精神充滿。接物和粹。人皆樂親炙之。語言有精魄。金鏘鍠鏗。使人側耳聳聽。有蹴然興起之意。而於天人感應殃慶類至之說。尤竭力戒厲。反覆不厭。故其教人也。人既易知昏明強弱。皆獲其心。老者則愛慈祥。幼者則樂恭順。莫不皆知忠信之爲美。固未能一變至道。去泰去甚。有足觀者。或有小過。深掩密覆。唯恐先生之知。凡先生杖屨所臨。人隨而化。浦陽鄭太和。十世同居。先生爲之喜動顏面。其家所講冠婚喪祭之禮。每咨於先生而後定。蓋先生之學。稽諸載籍。一以躬行爲本。以一心同天地之大。以耳目爲禮樂之原。積養之久。內外一致。夜寐即平晝之爲。暗室即康衢之見。汲汲孜孜。耄而彌篤。每見誇多鬬靡之士。輒語之曰。聖賢一言。終身行之弗盡矣。以爲多。至於拈英摘豔之辭。尤不樂顧。且以吾道蝨賊目之。及自爲文。率以理爲宗。非有關於綱常治化。不輕論也。居室垣墉。敦尚儉朴。服御唯大布寬衣。僅取蔽體。藜羹糲飯。安之如八珍。或在豪大姓家。當以肆筵設席。水陸之羞。交錯於前。先生正襟默坐。未嘗下箸。其清脩苦節。能爲人之所不能爲。而於世上所悅者。澹然無所嗜。惟欲聞人之善。如恐失之。隨聞隨錄。用爲世勸。遇有不順軌則者。必誨其改。事有難處者。又導之以其方。晚年識見尤卓。嘗自括蒼還。道過永康。謂人曰。青田之民。嚚悍。值此法弛令乖之時。必依險阻嘯聚爲亂。已而果然。又嘗告親友曰。吾足跡所及。廣矣。風俗澆漓。甚垂髫之童。亦能操狡謀罔上。天怒已極。必假手戮之。盡力善以延其胤乎。時方承平。聞者咸笑。先生之迂言未幾。天下大亂。空村無烟火。動百餘里。先生所著書。有宋論一卷。格致餘論若干卷。局方發揮若干卷。傷寒論辨若干卷。外科精要發揮若干卷。本草衍義補遺若干

卷風水問答若干卷凡七種微文奧義多發前人之所未明先生嘗曰義理精微禮樂制度吾門師友論著已悉吾可以無言矣故其所述獨志於醫爲多先生生於至元辛巳十一月二十八日卒于至正戊戌六月二十四日瀕卒無他言獨呼嗣汎謂曰醫學亦難矣汝謹識之言訖端坐而逝享年七十有八娶戚氏道一書院山長象祖之女先三十五年卒子男二嗣衍玉汝嗣衍亦先三年卒女四適傅似翁蔣長源呂文忠張思忠孫男一文椐女二一適丁檢一尚幼其年十一月日始葬先生于某山之原卒後之五月也先生所居曰丹溪學者尊之而不敢字故因其地稱之曰丹溪先生云夫自學術不明于天下凡聖賢防範人心維持世道之書往往割裂撫拾組織成章流爲譁世取寵之具間有注意遺經似若可尚又膠於訓詁之間異同紛拏有如聚訟其視身心皆藐然若不相關此其知識反出於不學庸人之下於戲秦漢以來則或然矣然而靈芻不鳴孽孤之妖弗息黃鍾不奏瓦缶之音日甚天開文運濂洛奮興遠明凡聖之緒流者遏而止之膠者釋而通之一期闔廓其昏翳挽回其精明而後已至其相傳唯考亭集厥大成而考亭之傳又唯金華之四賢續其世胤之正如印印泥不差毫末此所以輝連景接而芳猷允著也先生少負任俠之氣不少屈撓及聞道德性命之說遽變之而爲剛毅所以局量弘而載任重寤寐先哲唯日不足民吾同胞之念須臾莫忘雖其力或弗支苟遇惠利少足以濡物必委蛇周旋求盡其心應接之際又因人心感發之機而施仁義之訓觸類而長開物成化所謂風雨霜露無非君子之教者要亦不可誣也致思於醫亦能搜隱抉祕倡期南方之絕學嬰疢之家倚以爲命先生一布衣耳其澤物有如此

者使其得位於朝以行其道則夫明効大驗又將何如哉嗚呼先生已矣其山峙淵澄之色井潔石貞之操與其不可傳者弗能卽矣徒因其遺行而誦言之見聞不博惡能得十一於千百之間哉雖然舍是又無足以求先生者敢撫狀之概敍而爲之銘曰

濂洛有作性學復明考亭承之集厥大成化覃荆揚以及閩粤時雨方行區萌畢達世胤之正實歸金華緜延四葉益煒其葩辟諸上尊實彼逵路隨其志分不爽其度有美君子欲振其奇血氣方剛疇能侮予七尺之軀忍令顚越壯齡已踰而更其轍更之伊何我笈有書貧而東遊以祛所疑非刻非厲曷圖曷究豈止惜陰夜亦爲晝昔離其罣今廓其矇始知人心與宇宙同出將用世時有小利宇惠家邦庶亨厥志勤我祠事以帥其宗況有詩書以陶以甄以暢其施期壽夫物苟躬可捐我豈遑恤仁義之言繩繩勿休昭朗道眞釋除欲仇上帝有赫日注吾目天人之交間不容粟聽者聳然如聞巨鏞有聲鏗鏘無耳不聰旁溢於醫亦紹絕蹻開闡玄微功利尤博斂其豪英變爲毅弘所以百爲度越于人呫呫世儒出入口耳競藻闕華栻門殊軌以經爲戲此孰甚焉不有躬行其失曷鐫世塗方冥正資揚燎夢夢者天使埋其耀精神上征定爲長庚與造化遊白光煒煒表德幽墟遵古之義僉曰允哉是詞無愧

戴九靈良撰

丹溪翁傳

丹溪翁者婺之義烏人也姓朱氏諱震亨字彦脩學者尊之曰丹溪翁翁自幼好學日記千言稍長從鄉先生治經爲舉子業後聞許文懿公得朱子四傳之學講道八華山復往拜焉益聞道德性命之說宏深

粹密。遂爲專門。一日文懿謂曰。吾臥病久。非精於醫者不能以起之。子聰明異常人。其肯游藝於醫乎。翁以母病脾。於醫亦粗習。及聞文懿之言。即慨然曰。士苟精一藝以推及物之仁。雖不仕於時。猶仕也。乃悉焚棄向所習舉子業。一於醫致力焉。時方盛行陳師文、裴宗元所定大觀二百九十七方。翁窮晝夜是習。既而悟曰。摻古方以治今病。其勢不能以盡合。苟將起度量立規矩。稱權衡。必也素難諸經乎。然吾鄉諸醫鮮克知之者。遂治裝出游。求他師而叩之。乃渡浙河。走吳中。出宛陵。抵南徐。達建業。皆無所遇。及還武林。忽有以其羣羅氏告者。羅名知悌。字子敬。世稱太無先生。宋理宗朝寺人。學精於醫。得金劉完素之再傳。而旁通張從正、李杲二家之說。然性褊甚。特能厭事。難得意。翁往謁焉。凡數往返。不與接。已而求見愈篤。羅乃進之曰。子非朱彥脩乎。時翁已有醫名。羅故知之。翁既得見。遂北面再拜以謁。受其所教。羅遇翁亦甚懽。即授以劉張李諸書。爲之敷揚三家之旨。而一斷於經。且曰。盡去而舊學。非是也。翁聞其言。渙焉無少疑滯於胸臆。居無何。盡得其學以歸。鄉之諸醫泥陳裴之學者。聞翁言。即大驚而笑。且排。獨文懿喜曰。吾疾其遂瘳矣乎。文懿得末疾。醫不能療者餘十年。翁以其法治之。良驗。於是諸醫之笑且排者。始皆心服口譽。數年之間。聲聞頓著。翁不自滿足。益以三家之說推廣之。謂劉張之學。其說臟腑氣化有六。而於濕熱相火三氣。致病爲最多。遂以推陳致新瀉火之法療之。此固高出前代矣。然有陰虛火動。或陰陽兩虛濕熱自盛者。又當消息而用之。謂李之論飲食勞倦內傷脾胃。則胃脘之陽不能以升舉。幷及心肺之氣陷入中焦。而用補中益氣之劑治之。此亦前人之所無也。然天不足於西北。地不滿於東南。天陽也。

地、陰也。西北之人、陽氣易於降。東南之人、陰火易於升。苟不知此而徒守其法。則氣之降者固可愈。而於其升者亦從而用之。吾恐反增其病矣。乃以三家之論。去其短而用其長。又復參之以太極之理。易、禮記、通書、正蒙諸書之義。貫穿內經之言。以尋其指歸。而謂內經之言火。蓋與太極動而生陽五性感動之說有合。其言陰道虛。則又與禮記之養陰意同。因作相火及陽有餘陰不足二論以發揮之。其論相火有曰。陽動而變。陰靜而合。而生水火木金土。然火有二焉。曰君火。曰相火。君火者、人火也。相火者、天火也。火內陰而外陽。主乎動者也。故凡動皆屬火。以名而言。形質相生。配於五行。故謂之君。以位而言。生於虛無。守位稟命。故謂之相。天生物。恆於動。人有此生。亦恆於動。然其所以恆於動者。皆相火助之也。見於天者。出於龍雷。則木之氣也。出於海。則水之氣也。具於人者。寄於肝腎二部。肝屬木而腎屬水也。膽者、肝之府。膀胱者、腎之府。心胞絡者、腎之配。三焦以焦言而下焦司肝腎之分。皆陰而下也。天非此火不能生。人非此火不能以有生。天之火雖出於木。而皆本乎地。故雷非伏龍非蟄。海非附於地。則不能鳴。不能飛。不能波也。鳴也、飛也、波也。動而爲相火者也。肝腎之陰。悉具相火。人而同乎天也。或曰。相火、天人所同。東垣何以指爲元氣之賊。又謂火與元氣不兩立。一勝則一負。然則如之何而可使之無勝負乎。曰。周子曰。神發知矣。五性感動而善惡出。五者之性。爲物所感。不能不動。謂之動者。卽內經五火也。相火易動。五性厥陽之火。又從而扇之。則妄動矣。火旣妄動。則煎熬眞陰。陰虛則病。陰絕則死。君火之氣。經以暑與熱言之。而相火之氣。則以火言。蓋表其暴悍酷烈有甚於君火也。故曰。相火元氣之賊。周子曰。聖人定之以中正仁義而

主靜。朱子亦曰。必使道心常爲之主而人心每聽命焉。此善處乎火者也。人心聽命於道心而又能主之以靜。彼五火將發然不動而相火者。惟有扶助造化而爲生生不息之運用爾。夫何元氣之賊哉。或曰。內經相火註言少陰少陽矣。未嘗言及厥陰太陽。而吾子言之何也。曰。足太陽少陰東垣嘗言之。治以炒柏。取其味辛能瀉水中之火。戴人亦言。膽與三焦肝與胞絡皆從火治。此歷指龍雷之火也。余以天人之火皆生於地。如上文所云者。實廣二公之意耳。或曰。內經言火者非一。往往於六氣中見之。而言臟腑者未之有也。二公豈他有所據耶。曰。經以百病皆生於風寒暑濕燥火之動而爲變者。岐伯歷指病機一十九條。而屬火者五。此非相火爲病之出於臟腑者乎。考之內經。諸熱瞀瘈。則屬之火。諸狂燥越。則屬之火。諸病附腫痛酸驚駭。則屬之火。又原病式曰。諸風掉眩。屬於肝火之動也。諸風膹鬱病瘁。屬於肺火之升也。諸濕腫滿。屬於脾火之勝也。諸痛痒瘡瘍。屬於心火之用也。是皆火之爲病出於臟腑者然也。噫。以陳無擇之通達。猶以暖識論君火日用之火論相火。是宜後人之聾瞽哉。其論陽有餘陰不足有曰。人受天地之氣以生。天之陽氣爲氣。地之陰氣爲血。然氣常有餘而血常不足。何爲其然也。天大也。爲陽而運於地之外。地居天之中。爲陰而天之大氣舉之。日實也。屬陽而運於月之外。月缺也。屬陰而稟日之光以爲明者也。則是地之陰已不勝夫天之陽。月之陰亦不敵於日之陽。天地日月尙然。而況於人乎。故人之生。男子十六歲而精通。女子十四歲而經行。是有形之後。猶有待於乳哺水穀之養。而後陰可與陽配成乎人。而爲人之父母。古人必近三十二十而後嫁娶者。可見陰氣之難於成。而古人之善於保養也。錢仲陽於

腎有補而無瀉。其知此意者乎。又按禮記註曰。人惟五十。然後養陰者有以加。內經、年至四十。陰氣自半而起居衰矣。男子六十四歲而精絕。女子四十九歲而經斷。夫以陰氣之成。止爲三十年之運用而竟已先虧。可不知所保養也。經曰。陽者、天也。主外。陰者、地也。主內。故陽道實。陰道虛。斯言豈欺我哉。或曰。遠取諸天地日月。近取諸男子之身。曰有餘。曰不足。吾已知之矣。人在氣交之中。今欲順陰陽之理而爲攝養之法。如之何則可。曰。主閉藏者。腎也。司疏泄者。肝也。二藏皆有相火。而其系上屬於心。心、君火也。爲物所感則易於動。心動則相火翕然而隨。聖賢教人收心養心。其旨深矣。天地以五行更迭衰旺而成四時。人之五臟六腑。亦應之而衰旺。四月屬巳。五月屬午。爲火不旺。火爲肺金之夫。火旺則金衰。六月屬未。爲土大旺。土爲水之夫。土旺則水衰。況腎水嘗藉肺金爲母。以補助其不足。古人於夏月必獨宿而淡味。兢兢業業。保養金水二藏。正嫌火土之旺爾。內經又曰。冬藏精者。春不病溫。十月屬亥。十一月屬子。正元氣潛伏閉藏。以養其本然之眞。而爲來春升動發生之本。若於此時不忝欲以自戕。至春升之際。根本壯實。氣不輕浮。尙何病之可言哉。於是翁之醫益聞。四方以病來迎者。遂輻輳於道。翁咸往赴之。其所治病凡幾。病之狀何如。施何良方。飮何藥而愈。自前至今。驗者何人。何縣里主名。得諸見聞。班班可紀。浦江鄭義士病滯下。一夕。忽昏仆。目上視。瀼注而汗瀉。翁診之。脈大無倫。卽告曰。此陰虛陽暴絕也。蓋得之病後酒且內。然吾能愈之。急命治人參膏而且促灸其氣海頃之。手動。又頃而唇動。及參膏成。三飮之。甦矣。其後服參膏盡數斤。病已。天台周進士病惡寒。雖暑亦必以綿蒙其首。服附子數百。增劇。翁診之。脈滑而數。卽告

曰此熱甚而反寒也乃以辛涼之劑吐痰一升許而豪首之綿減半仍用防風通聖飲之愈周固喜甚翁曰病愈後須淡食以養胃內觀以養神則水可生火可降否則附毒必發殆不可救彼不能然後告疽發背死浙省平章南征閩粵還病反胃醫以爲可治翁診其脈告曰公之病不可言也即出獨告其左右曰此病得之驚後而使內火木之邪相挾氣傷液亡腸胃枯損食雖入而不化食既不化五臟皆無所稟去此十日死果如言鄭義士家一少年秋切病熱口渴而妄語兩顴火赤醫作大熱治翁診之脈弱而遲告曰此作勞後病溫惟當服補劑自已今六脈皆搏手必涼藥所致竟以附子湯啜之應手而瘥浙東憲幕傅氏子病妄語時若有所見其家妖之翁切其脈告曰此病痰也然脈虛弦而沉數蓋得之當暑飲酸又大驚傅曰然嘗夏因勞而甚渴恣飲梅水一二升又連得驚數次遂病翁以治痰補虛之劑處之旬浹愈里人陳時叔病脹腹如斗醫用利藥轉加翁診之脈數而澁告曰此得之嗜酒嗜酒則血傷血傷則脾土之陰亦傷胃雖受穀不能以轉輸故陽升陰降而否矣陳曰某以嗜酒前後溲見血者有年翁用補血之劑投之驗權貴人以微疾來召見翁至坐中堂自如翁診其脈不與言而出使詰之則曰公病在死法中不出三月且入鬼錄願猶有驕氣耶後果如期死一老人病目無見使來求治翁診其脈微甚爲製人參膏飲之目明如常時後數日翁復至忽見一醫在庭煉礜石問之則已服之矣翁愕然曰此病得之氣大虛今不救其虛而反用礜石不出此夜必死至夜參半氣奄奄不相屬而死一男子病小便不通醫治以利藥益甚翁診之右寸頗弦滑曰此積痰病也積痰在肺肺爲上焦而膀胱爲下焦上焦閉則下焦寒譬

如滴水之器。必上竅通。而後下竅之水出焉。乃以發大吐之。吐已。病如失。一婦人病不知。稍蘇。即號叫數四而復昏。翁診之。肝脈弦數而且滑。曰。此怒心所爲。蓋得之怒而强酒也。詰之。則不得於夫。每遲夜。引滿自酌。解其懷。翁治以流痰降火之劑。而加香附以散肝分之鬱。立愈。一女子病不食。面北臥者且半載。醫告術窮。翁診之。肝脈弦出左口。曰。此思男子不得。氣結於脾。故耳。叩之。則許嫁夫入廣且五年。翁謂其父曰。是病惟怒可解。蓋怒之氣擊而屬木。故能衝其土之結。今茅觸之使怒。耳父以爲不然。翁入而掌其面者三。責以不當有外思。女子號泣大怒。怒已。進食。翁復潛謂其父曰。思氣雖解。然必得喜。則庶不再結。乃詐以夫有書。且夕且歸。後三月。夫果歸而病不作。一婦人產後。有物不上如衣裾。醫不能喻。翁曰。此子宮也。氣血虛。故隨子而下。即與黃芪當歸之劑。而加升麻舉之。仍用皮工之法。以五倍子作湯洗濯。皺其皮。少選。子宮上。翁慰之曰。三年後可再生兒。無憂也。如之。一貧婦寡居病癩。翁見之惻然。乃曰。是疾世號難治者。不守禁忌耳。是婦貧而無厚味。寡而無欲。庶幾可療也。即自具藥療之。病愈。後復投四物湯數百。遂不發動。翁之爲醫。皆此類也。蓋其遇病施治。不膠於古方。而所療皆中。然於諸家方論。則靡所不通。他人斬斬守古。翁則操縱取舍。而卒與古合。一時學者咸聲隨影附。翁教之孳孳忘疲。一日。門人趙良仁問大極之旨。翁以陰陽造化之精微。與醫道相出入者論之。且曰。吾於諸生中。未嘗論至於此。今以吾子所問。故偶及之。是蓋以道相告。非徒以醫言也。趙出語人曰。翁之醫其始稟於此乎。羅成之自金陵來見。自以爲精仲景學。翁曰。仲景之書。收拾於殘篇斷簡之餘。然其間或文有不備。或意有未盡。或編次之脫落。

或義例之乖舛。吾每觀之。不能以無疑。因略摘疑義數條以示。羅尙未悟。及遇治一疾。翁以陰虛發熱而用益陰補血之劑療之。不三日而愈。羅乃歎曰。以某之所見。未免作傷寒治。今翁治此。猶以芎歸之性辛溫。而非陰虛者所宜服。又況汗下之誤乎。翁春秋既高。乃狥張翼等所請。而著格致餘論、局方發揮、傷寒辨疑、本草衍義補遺、外科精要新論諸書。學者多誦習而取則焉。翁簡慤貞良。剛嚴介特。執心以正。立身以誠。而孝友之行。實本乎天質。奉時祀也。訂其禮文而敬泣之。事母夫人也。時其節宜以忠養之。寧歉於己而必致豐於兄弟。寧薄於己子。而必施厚於兄弟之子。非其友不友。非其道不道。好論古今得失。慨然有天下之憂。世之名公卿。多折節下之。翁謂直陳治道。無所顧忌。然但語及榮利事。則拂衣而起。與人交。一以三綱五紀爲去就。嘗曰。天下有道。則行有枝葉。天下無道。則辭有枝葉。夫行、本也。辭、從而生者也。苟見枝葉之辭。去本而末是務。輒怒溢顏面。若將浼焉。翁之卓卓如是。則醫又特一事而已。然翁講學行事之大方。已具吾友宋太史濂所爲翁墓誌。茲故不錄。而竊錄其醫之可傳者爲翁傳。庶使後之君子得以互考焉。

論曰。昔漢嚴君平。博學無不通。賣卜成都。人有邪惡非正之問。則依箸龜爲陳其利害。與人子言依於孝。與人弟言依於順。與人臣言依於忠。史稱其風聲氣節。足以激貪而厲俗。翁在婺。得學道之源委。而混迹於醫。或以醫來見者。未嘗不以葆精毓神開其心。至於一語一默。一出一處。凡有關於倫理者。尤諄諄訓誨。使人奮迅感慨激厲之不暇。左丘明有云。仁人之言。其利博哉。信矣。若翁者。殆古所謂直諒多聞之益

友。又可以醫師少之哉。

王雲五主編

叢書集成初編

丹溪先生心法

附錄

四冊

中華民國二十八年十二月初版

撰者 朱震亨

編訂者 程充

發行人 王雲五 長沙南正路

印刷所 商務印書館

發行所 商務印書館 各埠

（本書校對者董雲霆）

G一八八〇上

平